



BULLETIN MENSUEL
SITUATION HYDROLOGIQUE DU RHONE
août 04


ANNEES D'ETIAGE ESTIVAL REMARQUABLE SUR LE BASSIN DU RHONE

		DEBITS MOYENS MENSUELS (m ³ /s) - source des données : CNR - base THALIE						
ANNEE		BOGNES	PERRACHE	COUZON (la Saône)	TERNAY	BEAUMONT MONTEUX (l'Isère) (1)	VALENCE	BEAUCAIRE
moyenne sur la période 1920-2003		480	570	160	730	270	1 040	1 090
années d'étiage estival remarquable	1921	480	550	90	630		850	850
	1949		360	40	400		580	650
	1976	190	220	60	270	110	380	520
	1989	360	390	70	460	160	600	620
	2003	410	430	30	460	220	730	740
2004	débit (m ³ /s)	450	600	170	770	220	1 000	1 140
	Rang (2)	37	58	58	60	12	49	49

(1) la chronique des débits de l'Isère est disponible sur la période 1956-2003. La moyenne est calculée sur cette période

(2) rang pour le mois d'août 2004 dans le classement croissant des débits moyens mensuels sur la période disponible

information non disponible



Commentaires : La pluviométrie soutenue sur l'ensemble du bassin rhodanien lors de la seconde quinzaine d'août 2004 a entraîné une hausse notable des débits permettant de sortir d'une situation d'étiage et d'avoir des valeurs mensuelles proches des normales. Pour exemple à Beaucaire, le débit moyen du 1^{er} au 15 août 2004 est de 820 m³/s alors qu'il est de 1450 m³/s pour la deuxième quinzaine d'août.

Remarques : Les débits annoncés pour l'année 2004 sont des valeurs brutes en cours de validation qui pourront être modifiées lors de la rédaction du rapport hydrologique annuel 2004 de la CNR.