





ANNEES D'ETIAGE ESTIVAL REMARQUABLE SUR LE BASSIN DU RHONE

		DEBITS MOYENS MENSUELS (m ³ /s) - source des données : CNR - base THALIE					
ANNEE		BOGNES	PERRACHE	COUZON (la Saône)	TERNAY	VALENCE	BEAUCAIRE
moyenne sur la période 1920-2005		300	630	710	1 350	1 670	2 020
années d'étiage estival remarquable	1921	160	290	330	620	800	900
	1949	170	260	170	430	580	770
	1976	270	510	850	1 360	1 640	2 070
	2003	300	580	650	1 200	1 660	1 970
	2004	290	550	610	1 150	1 420	1 900
	2005	300	570	630	1 200	1 490	1 550
2007	débit (m ³ /s)	370	710	710	1 420	1 680	1 750
	Rang *	68	59	51	55	54	40

* rang pour le mois de février 2007 dans le classement croissant des débits moyens mensuels sur la période 1920-2005

DEBITS MOYENS MENSUELS COMPARES AUX ETIAGES HISTORIQUES
FEVRIER 2007 - BASSIN DU RHONE



Commentaires :

Pour le mois de février 2007, les débits sont supérieurs à la moyenne sur le Haut-Rhône et jusqu'à Valence. Il sont légèrement inférieur à la moyenne en aval de Valence.

Pour le mois de février 2007, les 6 stations étudiées se positionnent entre le 40^{ème} et le 68^{ème} rang, sur les 88 dernières années. D'une manière générale, plus on descend vers l'aval, plus le coefficient d'hydraulicité diminue.

Remarques : Les débits annoncés pour l'année 2007 sont des valeurs brutes en cours de validation qui pourront être modifiées lors de la rédaction du rapport hydrologique annuel 2007 de la CNR.

Les valeurs des débits sont arrondis à +/- 10 m³/s.