





ANNEES D'ETIAGE ESTIVAL REMARQUABLE SUR LE BASSIN DU RHONE

		DEBITS MOYENS MENSUELS (m ³ /s) - source des données : CNR - base HYDROMET					
ANNEE		BOGNES	PERRACHE	COUZON (la Saône)	TERNAY	VALENCE	BEAUCAIRE
moyenne sur la période 1920-2007		300	630	710	1 340	1 660	2 010
années d'étiage estival remarquable	1921	160	290	330	620	800	900
	1949	170	260	170	430	580	770
	1976	270	510	850	1 360	1 640	2 070
	2003	300	580	650	1 200	1 660	1 970
	2004	290	550	610	1 150	1 420	1 900
	2005	300	570	630	1 200	1 490	1 550
2008	débit (m ³ /s)	300	430	310	730	1 010	1 210
	Rang *	57	27	9	15	17	15

* rang pour le mois de février 2008 dans le classement croissant des débits moyens mensuels sur la période 1920-2007

DEBITS MOYENS MENSUELS COMPARES AUX ETIAGES HISTORIQUES
FEVRIER 2008 - BASSIN DU RHONE



Commentaires :

Pour le mois de février 2008, les débits se situent dans la moyenne sur le Haut-Rhône et largement en dessous de la moyenne sur le Bas-Rhône. Le débit du Rhône a été soutenu par un apport conséquent du lac Léman (fonte des neiges).
Pour le mois de février 2008, la station de Bognes se positionne au 57^{ème} rang alors que les 5 autres stations étudiées se positionnent entre le 9^{ème} et le 27^{ème} rang sur les 89 dernières années.

Remarques : Les débits annoncés pour l'année 2008 sont des valeurs brutes en cours de validation qui pourront être modifiées lors de la rédaction du rapport hydrologique annuel 2008 de la CNR.
Les valeurs des débits sont arrondis à +/- 10 m³/s.