


**SITUATION PLUVIOMETRIQUE du nord du bassin
lors de la 1^{ère} décade de juin 2006 – du 1^{er} au 10 juin**

RAPPORT A LA NORMALE DES PRECIPITATIONS



Cette première décade du cumul d'étiage montre un déficit généralisé sur l'ensemble du bassin Rhône-Amont. Une grande partie sud de la région ne dépasse pas les 10% de rapport à la normale. Les zones déjà déficitaires présentent des sols superficiels particulièrement secs le long de la vallée du Rhône jusqu'à la région lyonnaise et sur le sud-ouest des Hautes-Alpes. L'excellent ensoleillement conjugué à un vent présent tout au long de cette décade participe à l'évaporation et conduit à un bilan hydrique fortement négatif.

Dept	STATIONS	Rapport à la normale (%)
52	LANGRES	13
70	LUXEUIL	16
25	BESANCON	19
39	LONS-LE-SAUNIER	11
21	DIJON-LONGVIC	15
71	MACON	5
01	AMBERIEU	4
69	LYON-BRON	4
42	ST-ETIENNE-BOUTHEON	11
38	GRENOBLE-ST-GEOIRS	2
73	CHAMBERY-AIX	2
	BOURG-ST-MAURICE	4
07	COLOMBIER-LE-JEUNE	0
	LANAS	0
26	MONTELIMAR	0
	LUS-LA-CROIX-HAUTE	0
05	EMBRUN	7