

SITUATION PLUVIOMETRIQUE du NORD DU BASSIN
lors de la 2^{ème} décennie d'octobre 2007 (du 11 au 20 octobre)


RAPPORT A LA NORMALES DES PRECIPITATIONS

Bassin Rhône amont

Rapport aux normales 1971/2000 des précipitations

OCTOBRE 2007 - 2^{ème} décennie

carte éditée en l'état de la base de données le 22/10/2007



A l'image des pluies, **les rapports à la normale sont faibles**. Ils ne dépassant pas les 10% sur la moitié sud du bassin ainsi que sur sa partie bourguignonne.

Une bande se situant sur les Monts du Beaujolais et le sud de ceux du Mâconnais et s'étendant sur la Dombes, le Jura et jusqu'au nord de Rhône-amont ne recueille que le quart des précipitations habituelles, voire à peine plus sur quelques zones très localisées. Il en est de même pour les Cévennes, le Pilat et le nord des Alpes.


SITUATION PLUVIOMETRIQUE du NORD DU BASSIN
lors de la 2^{ème} décade d'octobre 2007 (du 11 au 20 octobre)

RAPPORT A LA NORMALES DES PRECIPITATIONS depuis le 1^{er} juin 2007

Bassin Rhône amont


Rapport aux normales 1971/2000 des précipitations
du 1^{er} juin au 20 octobre 2007

carte éditée en l'état de la base de données le 22/10/2007



• points de mesure (420)

— limites des bassins versants



La faiblesse des pluies tombées durant cette décade contribue à l'**assèchement du bassin**. Le déficit gagne par le sud et atteint la limite St-Etienne - Grenoble - Chamonix.

Les secteurs les plus fortement déficitaires se trouvent sur les Cévennes, l'Uzègeois, le sud du Valentinois et les Alpes du sud, le cumul des précipitations depuis le 1^{er} juin représentant moins de la moitié de celui attendu (44% de la normale à St-Auban et à Barcelonnette (04), 47% à Tallard (05)).

Au nord de cette limite, des régions se normalisent comme la Dombes, le sud du Jura, le secteur de Vesoul et celui de Gray dans la vallée de la Saône(70) et les autres réduisent leur excédent.

SITUATION PLUVIOMETRIQUE du NORD DU BASSIN
lors de la 2^{ème} décennie d'octobre 2007 (du 11 au 20 octobre)

DONNEES METEO-FRANCE pour le bassin RHÔNE-AMONT

	OCTOBRE 2007 2 ^{ème} décennie	Depuis le 1 juin 2007
	rapport normale (%)	Cumul rapport normale (%)
LANGRES (52)	12	113
LUXEUIL (70)	8	105
BESANCON (25)	14	129
LONS LE SAUNIER (39) **	30	110
DIJON-LONGVIC (21)	3	137
MACON (71)	24	120
AMBERIEU (01)	14	128
LYON-BRON (69)	6	114
ST ETIENNE-BOUTHEON (42)	3	119
GRENOBLE-ST GEOIRS (38)	2	82
CHAMBERY-AIX (73) *	5	91
BOURG ST MAURICE (73)	5	106
LANAS SYN (07) **	1	43
MONTELIMAR (26)	1	46
LUS L CROIX HTE (26)	1	78
EMBRUN (05)	0	45

Nota

Par défaut, les normales portent sur la période 1971/2000.

(*) Normales portant sur la période 1981/2000.

(**) Normales portant sur la période 1991/2000.