


SITUATION PLUVIOMETRIQUE du NORD DU BASSIN
lors de la 3^{ème} décennie d'août 2008 (du 21 au 31 août)

RAPPORT A LA NORMALES DES PRECIPITATIONS

Bassin Rhône amont

Rapport aux normales 1971/2000 des précipitations
AOÛT 2008 - 3^{ème} décennie

carte éditée en l'état de la base de données le 03/09/2008



Au contraire de la décennie précédente, **cette décennie est majoritairement déficitaire sur le bassin.**

Moins de 10% des pluies attendues sont recueillies du sud-est de la Savoie au Briançonnais jusqu'au Champsaur et sur la majeure partie des Alpes de Haute-Provence : 4% à Tallard (05), 7% à Barcelonnette, 1% à Saint-Auban (04). Des noyaux de même déficit sont présents en Ardèche (9% à Montpezat-sous-Bauzon (07)) et en Drôme (8% à Puy-Saint-Martin).

La seule zone d'excédent se trouve dans la Drôme sur l'ouest du Vercors (124% à Beaufort-sur-Gervanne, 106% à Saint-Jean-en-Royans, 107% à Rochefort-Samson).


SITUATION PLUVIOMETRIQUE du NORD DU BASSIN
lors de la 3^{ème} décennie d'août 2008 (du 21 au 31 août)

RAPPORT A LA NORMALES DES PRECIPITATIONS depuis le 1^{er} juin 2008

Bassin Rhône amont

Rapport aux normales 1971/2000 des précipitations
du 1^{er} juin au 31 août 2008

carte éditée en l'état de la base de données le 02/09/2008



Les cumuls pluviométriques restent **proches des normales à excédentaires** sur une grande partie du bassin. Toutefois, les excédents s'amenuisent : 153% de la normale à Savigny-les-Beaune (21), 144% à Mont-Saint-Vincent (71), 165% à Saint-Jean d'Ardières (69), 158% à Marsaz (26), 132% à Séderon (26).

Sur le sud du sillon rhodanien qui présentait les plus forts excédents la décennie précédente, le rapport à la normale reste supérieur à 200% à Montélimar (224%) et à Marsanne (206%). Il est désormais de 191% à Montségur-sur-Lauzon (26) et 178% à Saint-Julien-de-Peyrolas (30).

Certains secteurs deviennent déficitaires dans le Diois (78% à Luc-en-Dois) et la Bochaine (87% à Rosans (05)).

Le déficit déjà présent la décennie précédente se creuse et s'étend de la Montagne de Lure au Gapençais et Parpaillon : 56% à Saint-Auban (04), 80% à Tallard (05), 76% à Barcelonnette (04).

SITUATION PLUVIOMETRIQUE du NORD DU BASSIN
lors de la 3^{ème} décennie d'août 2008 (du 21 au 31 août)

DONNEES METEO-FRANCE pour le bassin RHÔNE-AMONT

	AOÛT 2008 3 ^{ème} décennie	Depuis le 1 juin 2008
	rapport normale (%)	Cumul rapport normale (%)
LANGRES (52)	75	99
LUXEUIL (70)	45	100
BESANCON (25)	70	126
LONS LE SAUNIER (39) **	63	123
DIJON-LONGVIC (21)	92	134
MACON (71)	54	164
AMBERIEU (01)	38	131
LYON-BRON (69)	50	151
ST ETIENNE-BOUTHEON (42)	65	118
GRENOBLE-ST GEOIRS (38)	17	124
CHAMBERY-AIX (73) *	20	108
BOURG ST MAURICE (73)	64	134
LANAS SYN (07) **	15	120
MONTELIMAR (26)	43	224
LUS L CROIX HTE (26)	13	120
EMBRUN (05)	9	117

Nota

Par défaut, les normales portent sur la période 1971/2000.

(*) Normales portant sur la période 1981/2000.

(**) Normales portant sur la période 1991/2000.