


SITUATION PLUVIOMETRIQUE du SUD DU BASSIN lors de la 3^{ème} décennie d'août 2008 (du 21 au 31 août)


RAPPORT A LA NORMALE DES PRECIPITATIONS



Les rapports à la normale sont **très déficitaires**, dans la plus grande partie de la région, ils sont inférieurs à 10%, seules les quelques petites zones un peu arrosées sont proches des normales.

SITUATION PLUVIOMETRIQUE du SUD DU BASSIN lors de la 3^{ème} décade d'août 2008 (du 21 au 31 août)

RAPPORT A LA NORMALE DES PRECIPITATIONS depuis le 1^{er} juin 2008



Le déficit gagne du terrain et s'accroît encore.

Sur le Roussillon et la Provence les rapports sont entre 75 et 25% des normales (une petite zone est à moins de 25% à l'Ouest de Toulon et une autre au Nord d'Aix-en-Provence).

On trouve encore des rapports proches des normales sur l'Hérault, la Lozère, le nord du Gard et du Vaucluse, les Hautes Alpes et sur une zone à cheval sur les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute Provence et le Var.

SITUATION PLUVIOMETRIQUE du SUD DU BASSIN
lors de la 3^{ème} décade d'août 2008 (du 21 au 31 août)

DONNEES METEO-FRANCE pour le bassin RHÔNE-AVAL

	AOÛT 2008 3^{ème} décade	depuis le 1 juin 2008
	rapport normale (%)	Cumul rapport normale (%)
SAINT-AUBAN (04)	1	56
NICE (06)	0	49
ISTRES (13)	4	64
MARIGNANE (13)	1	40
SALON DE PROVENCE (13)	3	65
LE LUC (83)	0	82
HYERES (83)	1	86
TOULON (83)	0	31
ORANGE (84)	39	111
CARCASSONNE (11)	41	79
NIMES-COURBESSAC (30)	4	76
NIMES-GARONS (30)	5	81
MONT AIGOUAL (30)	20	78
MONTPELLIER (34)	0	85
PERPIGNAN (66)	1	36

NOTA : par défaut, les normales portent sur la période 1971/2000.