

SITUATION PLUVIOMETRIQUE du NORD DU BASSIN
lors de la 3^{ème} décennie de septembre 2008 (du 21 au 30 septembre)


RAPPORT A LA NORMALES DES PRECIPITATIONS

Bassin Rhône amont

Rapport aux normales 1971/2000 des précipitations

SEPTEMBRE 2008 - 3^{ème} décennie

carte éditée en l'état de la base de données le 02/10/2008



A l'image des cumuls de précipitations, **les rapports à la normale sont majoritairement inférieurs à 10% et très nombreux à être égaux à 0%**. Quelques chiffres pour illustrer la cartographie (la normale décennale est entre parenthèses) :

- 0% de rapport à la normale à Pontarlier (46,5 mm), Varennes-St-Sauveur (41,3 mm), Chamonix (38 mm), Villard-de-Lans (42,6 mm), Colombier-le-Jeune et Chomérac (58,3 mm), Montpezat-sous-Beauzon (83 mm), Villefort (96 mm), Marsaz (47,3 mm), Montboucher-sur-Jabron (55,5 mm), Mollans-sur-Ouvèze (48,4 mm) ;
- moins de 10% avec 1% à Savigny-lès-Beaune (30,5 mm), Lyon-St-Exupéry (39,2 mm), St-Marcel-lès-Valence (49,8 mm), St-Julien-de-Peyrolas (34,1 mm), Orange (30,9 mm), Rosans (40,3 mm), 2% à Bourdeaux (41,8 mm) et Séderon (44,5 mm), 3% à Tallard (37,2 mm) et 4% à Levier (49 mm).

L'extrême nord-est du bassin comme son extrême sud-est présentent les rapports à la normale les plus élevés, ceux-ci étant légèrement moins déficitaires que sur le reste de Rhône-amont : 26% des pluies habituelles sont recueillies à Belfort (90), 21% à Embrun (05), 13% à St-Auban et 14% à Barcelonnette (04), 12% à Bellegarde-en-Diois (26).


SITUATION PLUVIOMETRIQUE du NORD DU BASSIN
lors de la 3^{ème} décade de septembre 2008 (du 21 au 30 septembre)

RAPPORT A LA NORMALES DES PRECIPITATIONS depuis le 1^{er} juin 2008

Bassin Rhône amont

Rapport aux normales 1971/2000 des précipitations
du 1^{er} juin au 30 septembre 2008

carte éditée en l'état de la base de données le 02/10/2008



La faiblesse des pluies tombées durant cette troisième décade de septembre contribue à atténuer l'excédent existant sur le bassin à la fin de la décade précédente.

Les plus forts surplus présents sur l'Ardèche et la Drôme disparaissent presque, quelques stations de ce dernier département consignant toujours le double de la normale : Marsanne avec 212%, Montélimar avec 205% et Beaufort-sur-Gervanne avec 203%. Une zone allant de l'ouest du plateau de Chambarran à l'est du Haut-Vivarais, englobant le Valentinois jusqu'au Coiron et au Tricastin et se prolongeant le long de la vallée du Rhône jusqu'à l'ouest du Comtat Venaissin inscrit malgré tout des rapports à la normale encore supérieurs à 150% : 181% à Colombier-le-Jeune (07), 184% à Marsaz (26), 155% à St-Julien-de-Peyrolas et 169% à Orange (84).

La frange nord-ouest de Rhône-amont ainsi que le Jura comme le Chablais tendent vers la « normalisation » du cumul des pluies (le rapport à la normale diminue de 114% à 103% à Levier (25)).

Le déficit pluviométrique localisé sur les Cévennes et le plateau Ardéchois continue à progresser et à s'accroître : 67% de la normale à Bassurels et 62% à Villefort (48), 95% à Aubenas et Montpezat-sous-Beauzon, 110% au Cheylard (07). Le même phénomène se retrouve sur le sud-est du bassin où la zone normale à déficitaire progresse à l'ouest vers le Diois et au nord vers le Massif de la Vanoise : 89% des valeurs habituelles à Tallard (05), 73% à St-Auban et 74% à Barcelonnette (04), 104% à Bellegarde-en-Diois et 98% à Luc-en-Diois (26).

SITUATION PLUVIOMETRIQUE du NORD DU BASSIN
lors de la 3^{ème} décennie de septembre 2008 (du 21 au 30 septembre)

DONNEES METEO-FRANCE pour le bassin RHÔNE-AMONT

	SEPTEMBRE 2008 3 ^{ème} décennie	Depuis le 1 juin 2008
	rapport normale (%)	Cumul rapport normale (%)
LANGRES (52)	3	92
LUXEUIL (70)	0	116
BESANCON (25)	8	131
LONS LE SAUNIER (39) **	0	125
DIJON-LONGVIC (21)	0	121
MACON (71)	0	145
AMBERIEU (01)	0	144
LYON-BRON (69)	0	155
ST ETIENNE-BOUTHEON (42)	0	109
GRENOBLE-ST GEOIRS (38)	3	139
CHAMBERY-AIX (73) *	0	126
BOURG ST MAURICE (73)	2	150
LANAS SYN (07) **	0	108
MONTELIMAR (26)	0	205
LUS L CROIX HTE (26)	2	124
EMBRUN (05)	21	111

Nota

Par défaut, les normales portent sur la période 1971/2000.

(*) Normales portant sur la période 1981/2000.

(**) Normales portant sur la période 1991/2000.