



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 01000015

Ancien N° régional : 01450302

Bief des deux près

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 14,70 ha

Ain

SAMOGNAT

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	1
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	1	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	2

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 14

Description et intérêt du site

Nous sommes ici en limite est du Revermont, sur la rive gauche de l'Ain, déjà presque dans le Haut-Bugey. L'Oignin prend sa source au sud, dans le massif du Bugey, avant de mêler ses eaux à celles de la rivière d'Ain à hauteur de Coiselet, en aval du barrage du même nom. Le bassin versant de l'Oignin est riche en marais et la partie amont en est bien conservée. L'influence de l'homme est encore assez marquée ici avec l'usine des Trablettes et le lac de Matafelon. La rivière conserve malgré tout une assez bonne physionomie et plusieurs milieux annexes sont particulièrement intéressants. A l'est du lac de Matafelon, une belle mosaïque de milieux secs et humides compose ce secteur ; des prés de fauche alternent avec des zones tourbeuses. Parmi les plus riches, la prairie à Molinie bleue sur calcaire possède une variété floristique exceptionnelle. Le reste du secteur correspond à un ensemble de "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) alcalins, riches en laïches et en orchidées et formant des pelouses basses. Là où les conditions de sol sont particulièrement asphyxiantes, se développent des milieux fontinaux. Il s'agit d'un milieu relique, le Cratoneurion (Sources pétrifiantes avec formation de travertins), présentant un très grand intérêt scientifique et par conséquent très sensible à la moindre perturbation. Les secteurs boisés correspondent à un bois d'aulnes marécageux. La présence d'habitats naturels si variés sur une telle surface, rend ce secteur particulièrement intéressant.

Milieux naturels

34.32	PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
37.31	PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
38.2	PRAIRIES DE FAUCHE DE BASSE ALTITUDE
44.911	BOIS D'AULNES MARECAGEUX MESO EUTROPHES
54.12	SOURCES D'EAU DURE
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Epipactis des marais	<i>Epipactis palustris (L.) Crantz</i>
Gentiane des marais	<i>Gentiana pneumonanthe L.</i>
Gentiane d'Allemagne	<i>Gentianella germanica (Willd.) Börner</i>
Orchis odorant	<i>Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard</i>
Brunelle à grandes fleurs	<i>Prunella grandiflora (L.) Scholler</i>
Scorzonère peu élevée	<i>Scorzonera humilis L.</i>
Cumin des prés (Fenouil des chevaux)	<i>Silaum silaus</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie


Pas de données disponibles



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et de l'Aménagement
du Territoire

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°1000015



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)