



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 01000018

Ancien N° régional : 01450301

Marais du barrage d'Intriat, marais du Contour

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 56,92 ha

Ain

IZERNORE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	1	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	2

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 25

Description et intérêt du site

Le Revermont correspond aux premiers contreforts jurassiens, bordé à l'ouest par la Bresse et à l'est par les gorges de l'Ain. La roche calcaire affleure sur une vaste partie de ce paysage accidenté qui culmine à quelques 768 m d'altitude. Ce relief typiquement karstique, dessiné par l'action de l'eau sur la roche, est une vaste mosaïque de dolines, gouffres, lapiaz et autres reculées, où l'eau semble manquer. Si l'eau coule bien en surface là où la roche calcaire est recouverte par d'anciens alluvions, les pertes sont très importantes et souvent l'écoulement n'est que souterrain. Vallées sèches et résurgences sont une autre composante importante du paysage du Revermont. On se situe ici en limite est du Revermont, sur l'autre rive de l'Ain, déjà presque dans le Haut-Bugey. L'Oignin prend sa source au sud, dans le massif du Bugey, avant de mêler ses eaux à celles de la rivière d'Ain. Le bassin versant de l'Oignin est riche en marais et la partie amont bien conservée. L'influence de l'homme dans la vallée d'Izernore est assez marquée par les zones industrielles, cultures et sablières. La rivière conserve malgré tout une assez bonne physionomie et plusieurs milieux annexes sont particulièrement intéressants. Lors de l'inventaire de première génération, la vallée de l'Oignin était principalement retenue de Matabielon à Izernore pour ses colonies d'hirondelles de rivages. L'insuffisance des prospections naturalistes n'a pu permettre de confirmer ces observations n'ont pas été confirmées. Le secteur retenu correspond à un ensemble de marais et prairies alluviales, par contre bien connus. Une magnifique tourbière s'étend en amont immédiat du barrage des Trablettes. La mosaïque d'habitats naturels qui la compose la rend particulièrement attractive. Ce marais est en effet composé de deux zones humides aux fonctionnements hydrologiques distincts. A l'est l'alimentation permanente en eau par des sources jaillissant du versant a permis le développement de "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) alcalins et de prairies à Molinie bleue. Du côté ouest, sur la rive de l'Oignin, les apports d'eau sont dus uniquement à la rivière et au barrage d'Intriat. Une vaste roselière inondée sert de lieu de nidification aux oiseaux des marais. Une partie du marais se ferme peu à peu par la dynamique de la roselière et de la saulaie. Au nord, le petit barrage est partie intégrante du paysage. Une belle population de grèbes castagneux s'y reproduit. Plus au sud, la tourbière de Contour offre les mêmes habitats. Elle est bordée de bois, pelouses et prairies, mais est presque entièrement pâturée. Piétinement et enrichissement en matières organiques sont importants. L'ensemble de ces zones marécageuses présente une flore typique particulièrement riche : l'Epipactis des marais, la Scorsonère humble.... La présence de trois espèces de papillons protégées en France est très intéressante. Le Damier de la Succise dépose ses œufs sous les feuilles de la Succise des prés. Les chenilles ne se développent pas sur d'autres plantes. Les prairies humides, en bordure de la tourbière, offrent un milieu idéal pour cette espèce. Encore plus exigeant, l'Azuré des paluds nécessite la présence d'une plante-hôte, la Grande pimprenelle ou Sanguisorbe officinale, pour les premiers jours de la vie de sa chenille. Il a également besoin simultanément d'une fourmi qui héberge la chenille durant l'hiver. Ce secteur, encore bien conservé, est particulièrement intéressant mais sensible du fait des activités environnantes. Le reste de la vallée mériterait par ailleurs des efforts de prospection complémentaires.

Milieux naturels

37.31	PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
44.911	BOIS D'AULNES MARECAGEUX MESO EUTROPHES
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS

Flore

Laïche paradoxale	Carex appropinquata Schumacher
Epipactis des marais	Epipactis palustris (L.) Crantz
Fritillaire pintade	Fritillaria meleagris L.
Orchis odorant	Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard
Scorzonère peu élevée	Scorzonera humilis L.
Cumin des prés (Fenouil des chevaux)	Silaum silaus

Faune vertébrée

Mammifères	
Putois	Mustela putorius
Oiseaux	
Grèbe castagneux	Tachybaptus ruficollis

Faune invertébrée

Papillons	
Damier de la Succise	Euphydryas aurinia
Cuivré des marais	Lycaena dispar
Azuré des paluds	Maculinea nausithous

Bibliographie

BRAUD Y., SCHLEICHER J.

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

12 pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 -

13 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GORIUS N.

Marais du barrage d'Intriat - commune de Izernore (01) : suivi de la végétation en 2002

n.p. pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Marais du barrage d'Intriat - commune d'Izernore (01) : suivi des oiseaux des milieux inondés

n.p. pages 2004 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

GORIUS-FERRAND N., COIC B.

Le marais du barrage d'Intriat - commune d'Izernore (01) : plan de gestion 2002-2006

42 pages 2001 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

LAFRANCHIS J.

Le Damier de la Succise

p 1 pages 2003 Consultable : Pôle Relais Tourbières

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

ROZIER Y.

Biologie de la conservation des Azurés (Maculinea sp.) dans la Réserve Naturelle du Marais de Lavours

32 pages 1995 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Marais du barrage d'Intriat (Izernore, 01) : suivi d'Euphydryas aurinia, Lycaena dispar & Maculinea nausithous - inventaire complémentaire des lépidoptères rhopalocères

n.p. pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Suivi Maculinea - Marais des Bidonnes - été 1997

13 pages 1997 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Suivi scientifique du complexe Maculinea-Sanguisorba / Gentiana-Myrmica dans la Réserve Naturelle du Marais de Lavours - Rapport d'activité 1999


22 pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et de l'Aménagement
du Territoire

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°1000018



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)