



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 01000036

Ancien N° régional : 01271304

Tourbière de la Rochette

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 13,03 ha

Ain HAUTEVILLE-LOMPNES

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	1
Végétaux sucoérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 12

Description et intérêt du site

La tourbière de la Rochette fait partie d'un ensemble de milieux humides remarquables de basse et moyenne montagne du Bugey. Les tourbières sont très nombreuses dans ce secteur. Celle de la Rochette se situe dans un environnement boisé, à 1000 m d'altitude. La partie la plus à l'est est atterrie du fait du passage régulier d'engins de débardage. Elle est coupée par un chemin, et une remontée mécanique en marque la limite sud. Les limites retenues ici en concernent les parties les mieux conservées. La tourbière de la Rochette, sans être la plus spectaculaire du Bugey, conserve néanmoins un réel intérêt. Une très intéressante aulnaie-frênaie vient ainsi coloniser la partie la plus humide. Cet habitat est le plus souvent lié aux cours d'eau. Parfois, comme ici, on le rencontre dans les cuvettes trop humides pour le Hêtre. Ce type de milieu est très productif; il peut être menacé par des pratiques sylvicoles inadaptées. Le reste de la tourbière correspond à un ensemble de "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) alcalin à Laïche de Daval dominé par les cypéracées. On y trouve une flore remarquable (Swertie pérenne, Rossolis à feuilles rondes, Scirpe de Hudson, Fritillaire pintade...). La faune rencontrée sur le secteur est elle aussi de premier plan, notamment l'avifaune nicheuse : Râle des genêts, Rousserolle turdoïde... La tourbière de la Rochette est certes en partie dégradée, mais le secteur retenu conserve un grand intérêt. L'environnement forestier est très intéressant (phénomène de lisière), mais les activités humaines à proximité immédiate du site (remontée de ski, sylviculture) peuvent la fragiliser. Comme tous les habitats naturels tourbeux, elle représente un milieu menacé.

Milieus naturels

44.3 AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Faune vertébrée

Oiseaux

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus*
Alouette lulu *Lullula arborea*

Flore

Céillet superbe *Dianthus superbus L.*
Rossolis à feuilles rondes *Drosera rotundifolia L.*
Fritillaire pintade *Fritillaria meleagris L.*
Grande berce alpine *Heracleum sphondylium subsp. alpinum*
Peucedan des marais *Peucedanum palustre*
Swertie vivace *Swertia perennis L.*
Scirpe de Hudson *Trichophorum alpinum (L.) Pers.*

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

Pas de données disponibles




LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
 DU DÉVELOPPEMENT
 DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
 RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°1000036



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Ancecy



Echelle : 1 / 25 000
 fonds IGN Scan 25 (C)