



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 01000082

Ancien N° régional : 01030203

Etang Morel

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 116,07 ha

Ain

SAINT-TRIVIER-DE-COURTES, VESCOURS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	0
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons	1	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 9

Description et intérêt du site

Limitée à l'ouest par le val de Saône, à l'est par les premières collines du Revermont, la plaine de Bresse se distingue, au sud, de la Dombes, par une nature géologique particulière. Le substrat est constitué de sédiments sablo-argileux d'origine lacustre, remaniés lors des glaciations, et se présente sous forme de croupes très douces et assez monotones, ne dépassant pas 300 m d'altitude. La Bresse est une région bocagère. Champs de céréales entourés de haies et de bosquets d'arbres, prairies dans les vallons humides, quelques boisements où domine le Chêne sessile constituent l'essentiel du paysage. La présence d'étangs dans le centre de la plaine annonce la transition avec le plateau dombiste. Situé à l'extrême nord du département de l'Ain, l'étang Morel occupe une place essentielle entre Dombes, Bresse bourguignonne et Val de Saône. Inscrit dans un réseau d'étangs plus petits que lui, il présente une superficie remarquable lui permettant d'attirer une avifaune migratrice hivernante notable. La proximité d'une vieille chênaie favorable aux pics, l'ouverture du paysage et les zones de nourrissage liées aux pâtures voisines accroissent la valeur remarquable de ce plan d'eau. Ainsi cet étang est-il, en Bresse, le plus favorable à l'avifaune hivernante. Son intérêt est lié tant aux effectifs d'oiseaux observés qu'à la particularité des espèces rencontrées.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Flore

Macre nageante (Châtaigne d'eau) *Trapa natans* L.

Faune vertébrée

Oiseaux

Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>
Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

GUILLEMAIN M., SCHRICKE V.

Programme de recherches sur la Sarcelle d'hiver (Anas crecca) Etat d'avancement

p 1 pages 2005 Consultable : ONCFS

LECHANTRE P.

Le mystère des sarcelles d'hiver


p 4 pages 2004 Consultable : ONCFS



Liberté • Égalité • Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'ÉCARTIC
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
NATUREL ET PATRIMOINE
NATUREL

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°1000082



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)