



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 01050004

Ancien N° régional : 01220402,01220403

## Rochers de Nantua

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 310,23 ha

Ain

MONTREAL-LA-CLUSE

### Niveau de connaissance

|                     |   |            |   |            |   |             |   |
|---------------------|---|------------|---|------------|---|-------------|---|
| Milieux naturels    | 2 | Amphibiens | 0 | Reptiles   | 0 | Coléoptères | 0 |
|                     |   | Mammifères | 2 |            |   | Libellules  | 0 |
| Végétaux supérieurs | 2 | Oiseaux    | 2 | Crustacés  | 0 | Orthoptères | 0 |
| Mousses, lichens    | 0 | Poissons   | 0 | Mollusques | 0 | Papillons   | 0 |

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 20

### Description et intérêt du site

Le massif du Bugey est une région d'une très grande richesse biologique. A l'écart des principales voies de communication, au moins dans sa partie la plus au sud, il reste bien préservé. L'ensemble est particulièrement diversifié. Cette partie du Haut-Bugey est la plus artificialisée et est soumise à de fortes pressions. Le Bugey offre, avec ses nombreuses falaises, bon nombre de sites favorables à la nidification de certains rapaces. Celui retenu ici est tout à fait exceptionnel. Il est connu pour la nidification d'au moins un couple de Faucon pèlerin, suivie ici depuis plus de vingt cinq ans. Après avoir frôlé la catastrophe dans les années 1950/70, la situation de l'espèce s'améliore peu à peu. Mais si les effectifs remontent, on est encore loin de retrouver ceux des années 1940. La menace des pesticides organochlorés aujourd'hui passée, c'est la dégradation et la perturbation des sites de nidification qui pourraient affecter ce rapace. Une part importante des effectifs français niche dans le département de l'Ain. Les sites connus et retenus à l'inventaire sont ainsi de toute première importance pour la préservation de cette espèce dans notre pays. L'intérêt naturaliste du site est également botanique. Dans la falaise, poussent le Daphné caméléon, le Centranthe à feuilles étroites ou encore l'Epervière faux-buplèvre. Au-dessus, sur le plateau de Don, des clairières de tailles variées s'ouvrent sur des prairies à Molinie bleue. Ces milieux humides abritent notamment le Glaieul des marais. On remarque aussi la présence de plantes à affinités méridionales (Ail élégant, Stipe pennée, Trinie glauque...).

## Milieux naturels

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| 34.32 | PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES |
| 37.31 | PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES    |

## Faune vertébrée

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| <b>Mammifères</b> |                            |
| Chamois           | <i>Rupicapra rupicapra</i> |
| <b>Oiseaux</b>    |                            |
| Faucon pèlerin    | <i>Falco peregrinus</i>    |

## Flore

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ail joli                        | <i>Allium carinatum subsp. pulchellum</i> Bonnier & Layens |
| Centranthe à feuilles étroites  | <i>Centranthus angustifolius</i> (Miller) DC.              |
| Daphné camélé                   | <i>Daphne cneorum</i> L.                                   |
| Glaïeul des marais              | <i>Gladiolus palustris</i> Gaudin                          |
| Mélampyre à crêtes              | <i>Melampyrum cristatum</i> L.                             |
| Stipe à tige laineuse           | <i>Stipa eriocalis</i> Borbás                              |
| Stipe pennée (Plumet, Marabout) | <i>Stipa pennata</i> L.                                    |
| Trinie glauque                  | <i>Trinia glauca</i>                                       |
| Valérianelle dentée             | <i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich                   |

## Faune invertébrée

|                            |
|----------------------------|
| Pas de données disponibles |
|----------------------------|

## Bibliographie

**GORIUS N.**  
*Clairières du plateau de Nantua - commune de Nantua : suivi du glaieul des marais en 2004*  
n.p. pages 2004 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

**GORIUS-FERRAND N., FAVEROT P.**  
*Clairières du plateau de Nantua (la Colonne) - commune de Nantua : plan de gestion 2003-2007*  
32 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes




Ministère de l'Écologie,  
du Développement  
et de l'Aménagement  
du Territoire

Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES



# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°1050004



## Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - [www.infosig.net](http://www.infosig.net) - Annecy



Echelle : 1 / 25 000  
fonds IGN Scan 25 (C)