



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 01050006

Ancien N° régional : 01220405

Source de la Doye

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 8,19 ha

Ain

LES NEYROLLES

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	1	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 11

Description et intérêt du site

Le Haut-Bugey s'étend entre la cluse de Nantua à Bellegarde au nord et les cluses de l'Albarine et des Hôpitaux au sud. Dans le Haut-Bugey, Dépassant rarement 1000 m d'altitude, composé d'une succession de vaux dans sa partie ouest. Le climat conditionné par le relief, est caractérisé par de fortes précipitations (partout supérieures à 1000 mm/an). De par son caractère karstique, la circulation est avant tout souterraine, d'où les sources sont rares. Le site de la source de la Doye est un petit marais, formé à partir de la résurgence des Neyrolles, et bordé d'une prairie humide et d'une saulaie. Il s'inscrit dans un contexte assez artificialisé ; lors du premier inventaire, ce site était déjà en partie dégradé. Les limites ont donc été revues afin d'en exclure les secteurs dépourvus d'intérêt naturaliste. Les boisements humides sont bien représentés. Une frênaie humide colonise ainsi les abords du ruisseau et une partie du secteur. Ce type de peuplement qui tend souvent à disparaître au profit de plantations de peupliers regorge d'intérêts. On le trouve ici en compagnie d'une aulnaie marécageuse (à Aulne glutineux) dans les zones plus eutrophes. Les zones ouvertes correspondent à une cariçaie (formation végétale dominée par les laïches) de transition, qui forme ici des "tremblants" à Laïche aiguë dont certains sont très larges (plus de vingt mètres). On relève la présence de la Fougère des marais. Enfin, cette tourbière joue un rôle important de halte migratoire. Une impressionnante colonie de Foulque macroule hiverne sur ce secteur. La source de la Doye et son marais conservent donc un grand intérêt biologique, en dépit d'un contexte fortement artificialisé.

Milieux naturels

44.3	AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS
44.911	BOIS D'AULNES MARECAGEUX MESO EUTROPHES
54.5	TOURBIERES DE TRANSITION

Faune vertébrée

Oiseaux	
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>

Flore

Laïche des rives	<i>Carex riparia</i> Curtis
Potamot à feuilles perfoliées	<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.
Fougère des marais	<i>Thelypteris palustris</i> Schott

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie


Pas de données disponibles



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et du Territoire

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°1050006



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)