



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 01090001

Ancien N° régional : 01151201

Marais des Echets

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 56,19 ha

Ain MIONNAY, TRAMOYES

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	1	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 15

Description et intérêt du site

Situé dans la partie sud de la Dombes, le marais des Echets, ou Grand marais, est une dépression fermée d'origine glaciaire. Sa topographie a permis l'installation d'un sol particulier composé d'alluvions lacustres et de tourbe reposant plus ou moins directement sur le substratum morainique. Ces sols hydromorphes, très peu minéralisés et acides, ont permis l'établissement d'une végétation originale. De l'assèchement du marais commencé au quinzième siècle a résulté un appauvrissement de la faune et de la flore, surtout depuis les années 60. Deux secteurs sont ici délimités : la zone humide de sous le Riollet et celle près des Brotteaux. L'intérêt ornithologique réside dans la présence du Phragmites des joncs, de la Locustelle tachetée et du Bruant des roseaux, tous trois nicheurs. La flore remarquable est représentée, en particulier, par des herbes telles que le Pâturin des marais, le Calamagrostide blanchâtre, le Scirpe ovale et des oseilleilles telles que le Rumex patience d'eau ou le Rumex maritime. Bien que certaines soient relativement fréquentes en Dombes, elles restent menacées par la disparition de leur habitat. Citons également la Violette à feuilles de pêcher redécouverte récemment. Le marais des Echets a perdu de son intérêt, mais il reste encore quelques secteurs qui méritent attention. Il s'inscrit dans un environnement agricole de monoculture du maïs.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>
Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>

Flore

Aigremoine odorante	<i>Agrimonia procera</i> Wallr.
Calamagrostide blanchâtre	<i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth
Scirpe ovale	<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roemer & Schultes
Peucedan des marais	<i>Peucedanum palustre</i>
Paturin des marais	<i>Poa palustris</i> L.
Patience aquatique	<i>Rumex hydrolapathum</i> Hudson
Patience maritime (Oseille maritime)	<i>Rumex maritimus</i> L.
Violette à feuilles de Pêcher	<i>Viola persicifolia</i> Schreber

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

Agence MOSAIQUE Environnement

Document d'objectifs Natura 2000 - Etangs de la Dombe

33- pages 2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes




MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°1090001

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)