



Tourbière de Rougemont

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 18,72 ha

Ain BRENOD

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	1
Végétaux sucoérieurs	3	Oiseaux	0	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	2

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 19

Description et intérêt du site

Le Bugey, situé sur le côté est du département de l'Ain, constitue la partie méridionale du massif du Jura. Les précipitations sont particulièrement abondantes dans cette région puisqu'on relève souvent plus de 1500 mm sur l'année. Le substrat calcaire date du secondaire et a été soulevé au tertiaire, préfigurant les reliefs actuels. La combe de Léchaud, entre la cluse de Nantua et le plateau d'Hauteville, est un synclinal résultant de ces soulèvements géologiques. L'abondance des précipitations a favorisé l'installation, sur les replats, de plusieurs tourbières. Celles-ci occupent au total près de 10 % de la surface de la combe de Léchaud. La plus étendue de ces tourbières, la tourbière de Rougemont, s'étend sur plus de vingt hectares, à une altitude de 930 m. Les formations à Reine des prés et, plus encore, les prairies à Molinie bleue, se distinguent nettement des prairies pâturées environnantes. A la fin du printemps, la très forte concentration des renoncules à feuilles d'aconit teinte en blanc le sud du site de façon tout à fait remarquable. Un étang inonde le sud de la tourbière et favorise le développement de roselières. Seules ces roselières sont visibles à distance, alors que l'étang reste caché par la végétation et les reliefs environnants. Au nord de la tourbière, des zones de "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) alternent avec les prairies à Molinie bleue. La Swertie vivace y est abondante, ainsi que le Scirpe de Hudson, alors que la Scorsonère humble reste plus localisée. Au centre du site quelques buttes de bryophytes témoignent de l'extension ancienne d'une tourbière bombée, dégradée par une tentative avortée de mise en culture. Des drains ont été creusés à cet effet, limitant l'alimentation en eau et favorisant ainsi le retrait des sphaignes sur les secteurs les plus humides : face nord des buttes, gouilles temporaires. La Pie-grièche écorcheur, le Tarier des prés et le Tarier pâtre et d'autres encore sont parmi les oiseaux nicheurs bien implantés sur la tourbière et caractéristiques des milieux semi-ouverts. D'autres espèces sont liées aux eaux libres : Foulque macroule, Canard colvert, Râle d'eau nichent autour de l'étang, à une altitude relativement importante. L'étang est aussi la zone privilégiée pour quelques espèces de libellules. Au contraire les batraciens (Salamandre tachetée, Grenouille rousse, Crapaud commun) préfèrent les sources et trous d'eau non investis par les poissons.

Milieus naturels

54.2

BAS-MARAIS ALCALINS

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Laïche aigüe	<i>Carex acuta L.</i>
Laïche paradoxale	<i>Carex appropinquata Schumacher</i>
Fritillaire pintade	<i>Fritillaria meleagris L.</i>
Pédiculaire des marais	<i>Pedicularis palustris L.</i>
Saule rampant	<i>Salix repens L.</i>
Scorzonère peu élevée	<i>Scorzonera humilis L.</i>
Swertie vivace	<i>Swertia perennis L.</i>
Scirpe de Hudson	<i>Trichophorum alpinum (L.) Pers.</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

GORIUS N.

Tourbières de la combe de Léchaud - communes de Brénod et les Neyrolles (01) : suivis de la végétation en 2003

n.p. pages 2004 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

GORIUS-FERRAND N.

Les tourbières de la combe de Léchaud - communes de Brénod et les Neyrolles (01) : plan de gestion 2003-2007

51 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

ROZIER Y.

Suivi Lépidoptères année 2001 - Tourbière de Rougemont (Brenod, 01) : inventaire des lépidoptères rhopalocères

3 p. pages 2001 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

