

COTIERE MERIDIONALE DE LA DOMBES

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1 133 ha

Ain
BEYNOST, LA BOISSE, MIRIBEL, MONTLUEL, NEYRON, SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST,

Rhône
RILLIEUX-LA-PAPE,

ZNIEFF de type I concernées par cette zone

01160001,01160002,01160003

Description et intérêt du site

Entre Montluel et Neyron, dominant la vallée du Rhône désormais conquise par une urbanisation pratiquement ininterrompue, et frangée au nord par un secteur de cultures intensives, la côtière méridionale de la Dombes abritait autrefois de nombreuses stations remarquables de plantes méditerranéennes, généralement associées à des espaces ouverts, parvenant ici en limite de leur aire de répartition (Chêne vert, Ciste à feuilles de sauge...).

Cette particularité s'explique par une exposition générale très favorable, et par l'existence d'un substrat aride de cailloutis tertiaires et quaternaires.

Néanmoins, l'évolution du paysage local depuis un siècle, marquée notamment par l'extension spontanée des surfaces boisées, semble avoir eu raison de beaucoup de ces stations.

Les secteurs conservant le patrimoine biologique le plus remarquable restent néanmoins identifiés par plusieurs ZNIEFF de type I.

Le zonage de type II traduit quant à lui la persistance, le long de cette côtière, d'un réseau de stations botaniques intéressantes.

Il illustre également des fonctionnalités naturelles liées :

- à la protection du milieu physique (avec un rôle naturel de protection contre l'érosion des sols, à l'amont d'un secteur urbanisé sensible aux crues torrentielles),
- à la préservation des populations animales ou végétales. La côtière de la Dombes demeure notamment un corridor écologique remarquable, au sein duquel les infrastructures, denses dans ce secteur périurbain, n'introduisent en effet pas encore de solution de continuité irréversible.

Enfin, l'ensemble présente un intérêt géologique, géomorphologique et pédagogique, à proximité immédiate de l'agglomération lyonnaise et de ses universités.

Milieus naturels

34.33

PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES

Faune vertébrée

Pas de donnée disponible

Flore

Ail à tige anguleuse

Allium angulosum L.

Micropus dressé

Bombycilaena erecta

Ciste à feuilles de sauge

Cistus salviifolius L.

Liseron des Monts cantabriques

Convolvulus cantabricus L.

Orchis à trois dents

Orchis tridentata Scop.

Potentille des rochers

Potentilla rupestris L.

Pulsatille rouge

Pulsatilla rubra Delarbre

Scutellaire à feuilles hastées

Scutellaria hastifolia L.

Faune invertébrée

Pas de donnée disponible

Bibliographie



NETIEN G.

Complément à la flore lyonnaise

1996 pages : 125 p Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Flore lyonnaise

1993 pages : 623 p Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central



* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Légende

- Périmètre de la ZNIEFF type 2
- Autres ZNIEFF type 2
- ZNIEFF type 1

