



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 01190039

Ancien N° régional :

Pré Riondet et marais de sous-portes

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 8,08 ha

Ain MARCHAMP

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	0	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	2

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 8

Description et intérêt du site

Le massif du Bas-Bugey est une région d'une très grande richesse biologique. A l'écart des principales voies de communication, il reste bien préservé. Mais c'est sa physiologie qui présente le plus d'intérêt. De la plaine du Rhône au sommet du massif (Mollard Dedon, 1219 m d'altitude), le dénivelé est de près de 1000 m. Les conditions climatiques rencontrées sur l'ensemble du massif sont particulièrement variées et permettent une grande diversité botanique. Les milieux rencontrés sont aussi divers que tourbières, lacs, forêts montagnardes, pelouses sèches, pâturages, falaises... Cette zone appartient à un ensemble de zones humides situées sur le fond d'un synclinal orienté nord-ouest/sud-est. Tous ces sites étaient en connexion il y a une cinquantaine d'années. Le développement des ligneux (bourdaine, bouleau) est à l'origine de l'isolement de ces zones humides suite à l'arrêt des activités agricoles. Elle s'inscrit dans un cadre de combe boisée. Ce "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) alcalin est composé d'un premier ensemble de milieux humides au Pré Riondet au nord-ouest, et du marais de Sous-Portes au sud-est. Les principaux habitats naturels présents sont les moliniaies (pelouse à base de Molinie bleue), les cariçaies (formation végétale dominée par les laïches), les bas-marais à Choin ou à Laïche de Daval. Le saule rampant forme dans certains secteurs des nappes plus ou moins denses. Ces prairies humides accueillent quelques plantes rares ou protégées, telles que la Laïche à épillets rapprochés protégée en région Rhône-Alpes (mais bien représentée en Bas-Bugey) ou le Scirpe de Hudson... La faune, et particulièrement les libellules trouvent sur ce site des conditions favorables à leur cycle de vie. On note ainsi la présence de la Grande Aeschne et de la Cordulie à taches jaunes.

Milieux naturels

37.21 PRAIRIES HUMIDES ATLANTIQUES ET SUBATLANTIQUES

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Laïche paradoxale	<i>Carex appropinquata Schumacher</i>
Epipactis des marais	<i>Epipactis palustris (L.) Crantz</i>
Scirpe de Hudson	<i>Trichophorum alpinum (L.) Pers.</i>

Faune invertébrée

Libellules

Grande aeshne	<i>Aeshna grandis</i>
Cordulie à taches jaunes	<i>Somatochlora flavomaculata</i>

Bibliographie


Pas de données disponibles



LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction Régionale de l'Environnement
 RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°1190039



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
 fonds IGN Scan 25 (C)