



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 01190043

Ancien N° régional : 01352512

Tourbière de l'Etang

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 21,99 ha

Ain PREMEYZEL

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	2
Végétaux sucoérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	2	Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 15

Description et intérêt du site

Le massif du Bas-Bugey est une région d'une très grande richesse biologique. A l'écart des principales voies de communication, il reste bien préservé. Mais c'est sa physionomie qui présente le plus d'intérêt. De la plaine du Rhône au sommet du massif (Molard Dedon, 1219 m), le dénivelé est de près de 1000 m. Les conditions climatiques rencontrées sur l'ensemble du massif sont particulièrement variées et permettent une grande diversité botanique. Les milieux rencontrés sont aussi divers que tourbières, lacs, forêts montagnardes, pelouses sèches, pâturages, falaises... Le site est une tourbière dont la partie amont est occupée par un étang partiellement aménagé. Le site est recouvert d'une vaste prairie humide à Molinie bleue et de "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) à Choin noirâtre. Des ceintures de Marisque entourent l'étang. Des bosquets de Bouleau blanc agrémentent, par endroit, le site. Les milieux humides ouverts accueillent une flore riche. L'Epipactis des marais, en particulier, est une belle orchidée aux fleurs délicates. La Laîche faux-souchet est, quant à elle, rare dans l'Ain. Cette grande "herbe" forme des touradons. Autre plante remarquable, la Fougère des marais est encore bien représentée en région Rhône-Alpes malgré une régression généralisée. La faune est également bien représentée avec la présence de libellules dont l'Agrion de Mercure et la Libellule fauve. Le Martin-pêcheur d'Europe, également, trouve ici un milieu favorable. L'intérêt naturaliste du site est également paysager avec la proximité des Trois Chatels... Toutefois, il est désormais ceinturé de nombreux champs de céréales. La progression de la Bourdaine, également, est une menace. Elle provoque une fermeture progressive du milieu. D'autres zones sont envahies par le Solidage ou le Marisque...

Milieux naturels

37.31	PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
53.3	VEGETATION A CLADIUM MARISCUS
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS

Faune vertébrée

Oiseaux	
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Poissons	
Brochet	<i>Esox lucius</i>

Flore

Laïche faux-souchet	<i>Carex pseudocyperus L.</i>
Epipactis des marais	<i>Epipactis palustris (L.) Crantz</i>
Pulicaire commune (Herbe de Saint Roch)	<i>Pulicaria vulgaris Gaertn.</i>
Fougère des marais	<i>Thelypteris palustris Schott</i>

Faune invertébrée

Libellules	
Agrion de Mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>
Libellule fauve	<i>Libellula fulva</i>

Bibliographie

DELIRY C., GRAND D. et al.

L'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) dans la Moyenne vallée du Rhône : mise en perspective des données par rapport à la région Rhône-Alpes

21 pages 1998 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

GRAND D.

Les libellules du Rhône

255 pages 2004 Consultable : Société Linnéenne de Lyon




Liberté - Égalité - Fraternité
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
 DU DÉVELOPPEMENT
 DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
 RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°1190043



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
 fonds IGN Scan 25 (C)