



## Marais du Brayre

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 4,78 ha

Ain SAINT-BOIS

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	1	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	1
Végétaux sucoérieurs	2	Oiseaux	0	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 7

### Description et intérêt du site

Le massif du Bas-Bugey est une région d'une très grande richesse biologique. A l'écart des principales voies de communication, il reste bien préservé. Mais c'est sa physionomie qui présente le plus d'intérêt. De la plaine du Rhône au sommet du massif (Molard Dedon, 1219 m), le dénivelé est de près de 1000 m. Les conditions climatiques rencontrées sur l'ensemble du massif sont particulièrement variées et permettent une grande diversité botanique. Les milieux rencontrés sont aussi divers que tourbières, lacs, forêts montagnardes, pelouses sèches, pâturages, falaises... Le marais du Brayre appartient aux tourbières dites alcalines. Elles se développent sur des sols riches en calcaire. La tourbe qui s'y accumule est formée de nombreuses laïches mais aussi de mousses particulières : les hypnacées. Les tourbières alcalines sont fortement présentes dans les vallées alluviales et les Préalpes calcaires où l'influence des glaciers jurassiens et alpiens a été importante. Elles représentent 55% de la surface des tourbières de la région. Les milieux de tourbières alcalines sont en général très variés. Il est dominé par une cariçaie (formation végétale dominée par les laïches à Laïche élevée. Autour s'observe une bande plus ou moins large de Saule cendré. Des zones d'eau libre sont également présentes. La cladiaie (formation végétale dominée par le marisque) se développe localement. La diversité floristique du marais est relativement importante. Plusieurs espèces remarquables y croissent. Citons par exemple le Sénéçon des marais ou encore la Fougère des marais. La faune remarquable est représentée par la Cordulie à taches jaunes.

## Milieus naturels

44.911 BOIS D'AULNES MARECAGEUX MESOEUTROPHES  
53.3 VEGETATION A CLADIUM MARISCUS

## Faune vertébrée

Pas de données disponibles

## Flore

Séneçon des marais *Senecio paludosus L.*  
Fougère des marais *Thelypteris palustris Schott*

## Faune invertébrée

### Libellules

Cordulie à taches jaunes *Somatochlora flavomaculata*

## Bibliographie

Pas de données disponibles




Liberté - Égalité - Fraternité  
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
 DU DÉVELOPPEMENT  
 DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement  
 RHÔNE-ALPES



# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°1190047



## Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000  
 fonds IGN Scan 25 (C)