Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : **01200004**

Ancien N° régional : 01271301

Pelouses sèches de Virieu-le-Grand

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 18,57 ha

Ain VIRIEU-LE-GRAND

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques		Papillons	0

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **5**

Description et intérêt du site

Le massif du Bas-Bugey est une région d'une très grande richesse biologique. A l'écart des principales voies de communication, il reste bien préservé. Mais c'est sa physionomie qui présente le plus d'intérêt. De la plaine du Rhône au sommet du massif (Mollard Dedon, 1219 m d'altitude), le dénivelé est de près de 1000 m. Les conditions climatiques rencontrées sur l'ensemble du massif sont particulièrement variées et permettent une grande diversité botanique. Les milieux rencontrés sont aussi divers que tourbières, lacs, forêts montagnardes, pelouses sèches, pâturages, falaises... Pour le département de l'Ain, le Bas-Bugey est la seconde grande région de pelouses sèches après le Revermont. Plus des trois-quarts des pelouses recensées le sont dans l'une ou l'autre de ces deux régions. Le Mesobromion (pelouse maigre dominée par une graminée : le Brome dressé), habitat naturel qui comptent parmi ceux dont la protection est considérée comme un enjeu européen, est un milieu d'une très grande richesse floristique et faunistique. Presque toutes les pelouses abritent ici un grand nombre d'espèces d'orchidées, ainsi que des espèces comme la Marguerite de la Saint-Michel, la Campanule carillon, l'Orobanche d'Alsace, ou encore la Crépide rongée. D'une manière générale, la flore de la plupart de ces prairies est très diversifiée et l'on y retrouve l'ensemble du cortège caractéristique du Mesobromion (graminées, légumineuses…). L'intérêt naturaliste de la plupart de ces pelouses est donc manifeste. Certaines sont menacées de fermeture ou de reconversion alors que d'autres sont soumises à une pression trop forte de pâturage, qu'il soit bovin, équin, caprin ou équin.

Milieux naturels

34.32	PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Aster amelle (Marguerite de la Saint Michel)	*Aster amellus L.*
Campanule carillon	*Campanula medium L.*
Crépide rongée	*Crepis praemorsa (L.) F.L. Walther*
Orobanche d'Alsace	*Orobanche alsatica Kirschleger*

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

Pas de données disponibles

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°1200004



Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

N

Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)