



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 01210002

Ancien N° régional :

## Prairie de Grand Pâquier, prairie Bourbouillon

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 52,50 ha

Ain CEYZERIEU, CUZIEU

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	1	Reptiles	0	Coléoptères	1
		Mammifères	1			Libellules	0
Végétaux sucoérieurs	0	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 2

### Description et intérêt du site

Le massif du Bugey est une région d'une très grande richesse naturaliste. A l'écart des principales voies de communication, au moins dans sa partie la plus au sud, il reste bien préservé. L'ensemble est particulièrement diversifié. Au cœur de cette région, le secteur décrit offre au regard un paysage bas en altitude mais particulièrement vallonné, et de splendides panoramas sur le Grand Colombier et les premiers contreforts alpins. A seulement quelques kilomètres se dessinent la Dent du Chat et autres monts bordant le lac du Bourget. L'avifaune est particulièrement bien suivie sur ce secteur, les données sont continues et nombreuses. La présence régulière de deux couples de Chouette chevêche (ou Chevêche d'Athéna) depuis quelques années témoigne d'une campagne encore préservée, offrant de vieux arbres champêtres où nicher, et des prés dégagés et à végétation basse, riches en micro-mammifères. En période de reproduction, la Chouette chevêche est un véritable prédateur pour le campagnol. Peu de couples semblent présents dans cette région du Bugey. D'une manière générale, cette espèce est présente partout en France et les effectifs sont très mal connus. Cependant, ils connaissent un fort déclin sur tous les secteurs suivis régulièrement. Cette chute des effectifs est liée aux changements de pratiques agricoles : suppression des haies et vieux arbres présentant des cavités où elle peut nicher, développement des cultures impénétrables pour elle aux dépens des prés, utilisation d'insecticides contre les micro-mammifères. La préservation de cette espèce passe par la conservation d'un milieu favorable. D'une manière générale les autres espèces rencontrées sont typiques de cette mosaïque de bois, prés et vergers : Alouette lulu, Tarier pâtre, Lorient d'Europe, Torcol fourmilier...

## Milieus naturels

Pas de données disponibles

## Faune vertébrée

### Oiseaux

Chouette chevêche	<i>Athene noctua</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>

## Flore

Pas de données disponibles

## Faune invertébrée

Pas de données disponibles

## Bibliographie

### BLACHE S.

*La Chevêche d'Athéna : rapport 2005*

20 pages 2005 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes

### COUDURIER C.

*Une action pour la chouette chevêche (étude, conservation et sensibilisation)*

37 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

### FERRUS L.

*Influence de l'organisation des paysages sur la répartition de la chouette chevêche (Athene noctua scop.)*

43 pages Consultable : Parc National des Ecrins

### SIMONNET E.

*La chouette chevêche en campagne*

p 4 pages 1998 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble




LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ  
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°1210002



## Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000  
fonds IGN Scan 25 (C)