



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 01210012

Ancien N° régional :

Marais de Crapéou

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 11,27 ha

Ain

CONZIEU

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	2	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	2
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	0	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	3

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 10

Description et intérêt du site

Le massif du Bas-Bugey est une région d'une très grande richesse biologique. A l'écart des principales voies de communication, il reste bien préservé. Mais c'est sa physionomie qui présente le plus d'intérêt. De la plaine du Rhône au sommet du massif (Molard Dedon, 1219 m), le dénivelé est de près de 1000 m. Les conditions climatiques rencontrées sur l'ensemble du massif sont particulièrement variées et permettent une grande diversité botanique. Les milieux rencontrés sont aussi divers que tourbières, lacs, forêts montagnardes, pelouses sèches, pâturages, falaises... Le marais de Crapéou appartient aux tourbières dites alcalines. Elles se développent sur des sols riches en calcaire. La tourbe qui s'y accumule est formée de nombreuses laîches mais aussi de mousses particulières : les hypnacées. Les tourbières alcalines sont fortement présentes dans les vallées alluviales et les Préalpes calcaires où l'influence des glaciers jurassiens et alpiens a été importante. Elles représentent 55% de la surface des tourbières de la région. Le marais de Crapéou est composé de milieux humides variés : phragmitaie, "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) à Choin, aulnaie... Plusieurs espèces remarquables s'y développent. Citons par exemple la Fougère des marais, présente sous l'aulnaie, la Scorsonère humble et le Peucedan des marais dans les milieux ouverts. La faune est assez riche. C'est le cas notamment en ce qui concerne les papillons, tels que le Cuivré des marais. Il est lié à la présence d'oseilles sauvages sur lesquelles il pond ces œufs. La chenille se nourrira de leur limbe quelques jours plus tard.

Milieux naturels

44.911	BOIS D'AULNES MARECAGEUX MESOEUTROPHES
--------	--

Faune vertébrée

Amphibiens	
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>

Flore

Orchis des marais	<i>Orchis laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Bonnier & Layens</i>
Peucedan des marais	<i>Peucedanum palustre</i>
Scorzonère peu élevée	<i>Scorzonera humilis L.</i>
Cumin des prés (Fenouil des chevaux)	<i>Silaum silaus</i>
Fougère des marais	<i>Thelypteris palustris Schott</i>

Faune invertébrée

Libellules	
Cordulie à taches jaunes	<i>Somatochlora flavomaculata</i>
Papillons	
Cuivré des marais	<i>Lycaena dispar</i>

Bibliographie


Pas de données disponibles



Ministère de l'Écologie,
du Développement
durable et de l'Énergie
Ministère de l'Environnement
et du Développement
durable

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°1210012



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)