



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 07000018

Ancien N° régional : 07204503

Coteau de Vesseaux

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 329,70 ha

Ardèche

SAINT-LAURENT-SOUS-COIRON, SAINT-PRIVAT, VESSEAUX

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	0
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 21

Description et intérêt du site

Ce site intègre les coteaux à l'est de Vesseaux. Il jouxte le site de la vallée de la Louyre. Ce secteur est situé sur substrat calcaire en limite nord de la zone méditerranéenne. Sur une partie, le versant a été en grande partie planté en Pin noir d'Autriche. Ces boisements, déjà relativement anciens, sont discontinus et parfois très clairs. Ils sont très propices à la nidification de plusieurs espèces de rapaces diurnes (Circaète Jean-le-Blanc, Autour des palombes...). Les vides forestiers sont occupés par une mosaïque de pelouses sèches, de garrigues basses et de landes à Buis, ainsi que par des affleurements rocheux. Une petite fougère, la Doradille des sources pousse volontiers dans les anfractuosités ombragées de ces rochers ; elle est typique de la moyenne montagne. Les milieux ouverts et semi-ouverts sont occupés par l'Alouette lulu et plusieurs fauvettes méditerranéennes (Fauvettes pitchou, passerinette et mélanocéphale), mais aussi par une bonne population de Bruant fou. Cette dernière espèce atteint ici la limite méridionale de son aire de répartition géographique.

Milieux naturels

32.162	MATTORAL OCCIDENTAL A CHENES CADUCIFOLIES
34.33	PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES
34.5	PELOUSES XEROPHILES MEDITERRANEENNES
44.122	SAUSSAIES A SAULE POURPRE MEDITERRANEENNES

Flore

Doradille des sources	<i>Asplenium fontanum (L.) Bernh.</i>
Euphorbe de Nice	<i>Euphorbia nicaeensis All.</i>

Faune vertébrée

Mammifères	
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>
Oiseaux	
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Merle de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i>
Reptiles	
Couleuvre de Montpellier	<i>Malpolon monspessulanus</i>

Faune invertébrée

Papillons	
Proserpine	<i>Zerynthia rumina</i>

Bibliographie

BAYLE B.
Inventaire des Orchidées d'Ardèche - Bilan provisoire fin 99
39 pages 1999 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

CORA
Atlas des Chiroptères de Rhône-Alpes, hors série n°2
134 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes


LAFRANCHIS T.
Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles
448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

VINCENT S.
Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grottes à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire
16 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

VINCENT S., ISSARTEL G.
Inventaire des gîtes cavernicoles d'intérêt majeur pour les chiroptères en région Rhône-Alpes
42 pages 2005 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Inventaire du patrimoine naturel

ZNIEFF* N°7000018



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)