

BASSIN DE L'EYRIEUX

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 32 634 ha

Ardèche

ACCONS, AJOUX, ALBON, BEAUCHASTEL, BEAUVENE, CHALENCON, LE CHEYLARD, CREYSSEILLES, DUNIERES-SUR-EYRIEUX, FLAVIAC, GILHAC-ET-BRUZAC, GLUIRAS, ISSAMOULENC, LYAS, MARCOLS-LES-EAUX, MEZILHAC, NONIERES, LES OLLIERES-SUR-EYRIEUX, POURCHERES, PRANLES, ROMPON, SAINT-BARTHELEMY-LE-MEIL, SAINT-CHRISTOL, SAINT-CIERGE-LA-SERRE, SAINT-CIERGE-SOUS-LE-CHEYLARD, SAINT-ETIENNE-DE-SERRE, SAINT-FORTUNAT-SUR-EYRIEUX, SAINT-GENEST-LACHAMP, SAINT-JEAN-CHAMBRE, SAINT-JULIEN-DU-GUA, SAINT-JULIEN-LABROUSSE, SAINT-JULIEN-LE-ROUX, SAINT-LAURENT-DU-PAPE, SAINT-MAURICE-EN-CHALENCON, SAINT-MICHEL-D'AURANCE, SAINT-MICHEL-DE-CHABRILLANOUX, SAINT-PIERREVILLE, SAINT-PRIX, SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT, SAINT-VINCENT-DE-DURFORT, SILHAC, VERNOUX-EN-VIVARAIS, LA VOULTE-SUR-RHONE,

ZNIEFF de type I concernées par cette zone

07050001,07050002,07050003,07050004,07050005,07050006,07050007,07050008,07050009,07050010,07050011,07050012,07050013,07050014

Description et intérêt du site

Le pays des Boutières offrant un horizon de plateaux partiellement cultivés avec terrasses et châtaigneraies, de sommets arrondis couronnés de landes (les « Serres ») entrecoupés de vallées plus boisées.

L'Eyrieux et ses affluents sinuent dans des gorges qui ne présentent pas le caractère grandiose de celles de l'Ardèche, mais n'en présentent pas moins un intérêt naturaliste marqué, avec des stations de plantes remarquables (certaines témoignant d'influences océaniques, d'autres endémique du Massif Central comme l'Œillet du granite, beaucoup étant au contraire des méridionales parvenant ici en limite nord de leur aire de répartition...) et des biotopes favorables aux rapaces et aux libellules (avec là aussi des espèces à répartition méridionale, telles que l'Agrion blanchâtre).

Certains cours d'eau de bonne qualité présentent par ailleurs un grand intérêt hydrobiologique et ichtyologique.

L'originalité de ce patrimoine est retranscrite par de nombreuses zones de type I, délimitant les espaces abritant les habitats ou les espèces les plus remarquables (ruisseaux, versants secs, grottes...).

Le zonage de type II, outre l'importance de ces corrélations, souligne particulièrement les fonctionnalités naturelles liées :

- au régime hydraulique (avec un effet en matière de ralentissement du ruissellement torrentiel, en régime de crue méditerranéenne),
- à la protection des sols,
- à la préservation des populations animales ou végétales, en tant que corridor écologique (notamment en ce qui concerne la faune piscicole), zone de passages et d'échanges entre le Massif Central et le couloir rhodanien, de zone d'alimentation ou de reproduction (en particulier pour des poissons tels que le Barbeau méridional ou le Toxostome, des batraciens comme la Rainette méridionale, des reptiles parmi lesquels le Lézard ocellé, des mammifères tels que la Loutre, le Castor d'Europe, la Genette ou plusieurs chiroptères, des oiseaux parmi lesquels le Bruant ortolan, le Pipit rousseline, plusieurs fauvettes méditerranéennes ou le Merle de roche...).

Il souligne également la sensibilité particulière d'un bassin versant qui alimente des cours d'eau abritant encore des espèces particulièrement fragiles (telles que l'Ecrevisse à pattes blanches).

On soulignera également l'importance locale de la composante biogéographique, ce secteur marquant la limite d'aire de nombreuses espèces animales ou végétales à affinités méditerranéennes.

Enfin, la qualité du paysage local mérite d'être prise en compte.

Milieux naturels

31.21	LANDES SUB MONTAGNARDES A VACCINIUM
31.842	LANDES A CYTISUS PURGANS
32.344	MAQUIS A CISTUS LAURIFOLIUS
34.41	LISIERES XERO THERMOPHILES
38.3	PRAIRIES DE FAUCHE DE MONTAGNE
45.3	FORETS DE CHENES VERTS MESO ET SUPRA MEDITERRANEENNES
62.3	DALLES ROCHEUSES
65	GROTTES

Flore

Erable de Montpellier	<i>Acer monspessulanum</i> L.
Chardon du Vivarais	<i>Carduus vivariensis</i>
Ciste à feuilles de sauge	<i>Cistus salviifolius</i> L.
Œillet du granite	<i>Dianthus graniticus</i> Jordan
Doronic mort-aux-panthères	<i>Doronicum pardalianches</i> L.
Rossolis à feuilles rondes	<i>Drosera rotundifolia</i> L.
Gagée des rochers (de bohême)	<i>Gagea bohemica</i> (Zauschner) Schultes & Schultes fil
	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker-Gawler
Gagée jaune	<i>Hypericum linariifolium</i> Vahl
Millepertuis à feuilles de Linaire	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.
Impatiente ne-me-touchez-pas	<i>Logfia arvensis</i> (L.) J. Holub
Cotonnière des champs	<i>Orchis coriophora</i> L.
Orchis punaise	<i>Orchis coriophora</i> subsp. <i>coriophora</i>
Orchis punaise	<i>Orchis laxiflora</i> Lam.
Orchis à fleurs lâches	<i>Osmunda regalis</i> L.
Fougère royale	<i>Pedicularis sylvatica</i> L.
Pédiculaire des forêts	<i>Peucedanum carvifolium</i>
Peucédan à feuilles de carvi	<i>Potentilla rupestris</i> L.
Potentille des rochers	<i>Pulsatilla rubra</i> Delarbre
Pulsatille rouge	<i>Ranunculus monspeliacus</i> L.
Renoncule de Montpellier	<i>Ranunculus paludosus</i> Poiret
Renoncule des marais	<i>Reseda jacquinii</i> Reichenb.
Réséda de Jacquin	<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl
Sagine noueuse	<i>Scorzonera humilis</i> L.
Scorzonère peu élevée	<i>Sempervivum tectorum</i> subsp. <i>arvernense</i> (Lecoq & Lamotte) Rouy & Camus
Joubarbe d'Auvergne	

Faune vertébrée

Amphibien

Sonneur à ventre jaune	<i>Bombina variegata</i>
Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>
Rainette méridionale	<i>Hyla meridionalis</i>
Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>

Mammifère

Barbastelle	<i>Barbastella barbastellus</i>
Castor d'Europe	<i>Castor fiber</i>
Genette	<i>Genetta genetta</i>
Loutre	<i>Lutra lutra</i>
Vespertilion de Bechstein	<i>Myotis bechsteini</i>
Vespertilion de Natterer	<i>Myotis nattereri</i>
Pipistrelle de Nathusius	<i>Pipistrellus nathusii</i>
Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>
Molosse de Cestoni	<i>Tadarida teniotis</i>

Oiseau

Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Merle de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>
Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>
Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>
Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i>
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>

Poisson

Barbeau méridional	<i>Barbus meridionalis</i>
Toxostome	<i>Chondrostoma toxostoma</i>

Reptile

Coronelle girondine	<i>Coronella girondica</i>
Couleuvre d'Esculape	<i>Elaphe longissima</i>
Lézard des souches	<i>Lacerta agilis</i>
Lézard ocellé	<i>Lacerta lepida</i>
Lézard hispanique	<i>Podarcis hispanica</i>

Faune invertébrée

Crustacé

Ecrevisse à pattes blanches	<i>Austropotamobius pallipes</i>
-----------------------------	----------------------------------

Libellule

Aeschne paisible	<i>Boyeria irene</i>
Caloptéryx hémorroïdal	<i>Calopteryx haemorrhoidalis</i>
Calopteryx méditerranéen	<i>Calopteryx xanthostoma</i>
Gomphus à pincés	<i>Onychogomphus forcipatus</i>
Cordulie à corps fin	<i>Oxygastra curtisi</i>
Agrien orangé	<i>Platynemis acutipennis</i>
Agrien blanchâtre	<i>Platynemis latipes</i>

Bibliographie

Anonyme

Compte rendu d'herborisations : herborisations à Saint-Jean-Chambre. 3 mai 1987

1987 pages : 11-14 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

On a trouvé... On a retrouvé

2006 pages : 2-5 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

BAYLE B.

Des nouvelles de l'Inventaire des Orchidées

1999 pages : 33-41 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Inventaire des Orchidées d'Ardèche - Bilan provisoire fin 99

1999 pages : 39 p. Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

BOUDRIE M.

Les ptéridophytes du département de l'Ardèche (France)

2005 pages : 17-73 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

CHOISNET G.

Caractérisation des végétations du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche

2005 pages : Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

DESCOINGS B.M.

Compte-rendu d'herborisations : stage sur la Corniche de l'Eyrieux. 6-8 juin 1987

1987 pages : 25-40 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Vivarais. I. Présentation générale. Documents pour la 120ème session de la Société botanique de France

1988 pages : 132 p Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

KERVYN A.

Différentes communications sur certaines espèces

2000 pages : 6-14 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

NETIEN G.

Complément à la flore lyonnaise

1996 pages : 125 p Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

RIVON L.

Promenade botanique 1984 sur le GR42

1984 pages : 17-28 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

TISON J.M.

Révision des Gagea du groupe bohémica en France

1996 pages : 11-17 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central


WUILLOT J.

Sortie du 19 mai 1996 au pont de Chervil, basse vallée de l'Eyrieux (Ardèche)

1996 pages : 9-10 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central


Sortie du 9 mai à Saint Fortunat-sur-Eyrieux (Ardèche)

1999 pages : 15-16 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central



* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Légende

-  Périmètre de la ZNIEFF type 2
-  Autres ZNIEFF type 2
-  ZNIEFF type 1



fonds IGN Scan 100 (C)