



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 07060010

Ancien N° régional :

Zones humides de l'Ouleyre et des Présailles

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 346,50 ha

Ardèche CROS-DU-GEORAND, SAINTE-EULALIE, USCLADES-ET-RIEUTORD

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	2
Végétaux sucoérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 51

Description et intérêt du site

Cette zone est composée essentiellement de milieux ouverts entrecoupés de quelques hêtraies. Outre des prairies de fauche, ceux-ci incluent un vaste ensemble de milieux humides, essentiellement représentés par des prairies humides, avec localement des tourbières hautes ou "haut-marais" et des "treublants". Les hauts-marais, en particulier, se forment grâce à l'action de mousses spécifiques, les sphaignes. Tandis que croît la partie supérieure de la mousse, sa partie inférieure périt et se transforme en tourbe. C'est ainsi que se forme lentement une épaisse couche de tourbe, qui s'élève au-dessus de la nappe phréatique. La flore est particulièrement riche avec plusieurs espèces protégées : le Rossolis à feuilles rondes, le Sénéçon hélénitis, l'Orpin velu. Ces zones humides abritent quelques couples de vanneaux huppés et d'importantes populations de Pipit farlouse et de Tarier des prés. La Bécassine des marais est régulière aux deux passages. Parmi les papillons diurnes, l'abondance du Moiré ottoman, espèce à répartition très limitée en France, mérite d'être signalée, ainsi que la présence de deux espèces protégées : l'Azuré des mouillères et le Damier de la Succise.

Milieus naturels

35.1	PELOUSES ATLANTIQUES A NARD RAIDE ET COMMUNAUTES PROCHES
37.21	PRAIRIES HUMIDES ATLANTIQUES ET SUBATLANTIQUES
38.3	PRAIRIES DE FAUCHE DE MONTAGNE
54.5	TOURBIERES DE TRANSITION

Flore

Laïche puce	<i>Carex pulicaris L.</i>
Rosolis à feuilles rondes	<i>Drosera rotundifolia L.</i>
Prêle des bois	<i>Equisetum sylvaticum L.</i>
Gentiane des marais	<i>Gentiana pneumonanthe L.</i>
Pédiculaire des marais	<i>Pedicularis palustris L.</i>
Pédiculaire des forêts	<i>Pedicularis sylvatica L.</i>
Potentille des marais (Comaret)	<i>Potentilla palustris (L.) Scop.</i>
Saule à cinq étamines	<i>Salix pentandra L.</i>
Scorzonère peu élevée	<i>Scorzonera humilis L.</i>
Orpin velu	<i>Sedum villosum L.</i>
Séneçon à feuilles en spatule	<i>Tephrosia helenitis (L.) B. Nordenstam</i>

Faune vertébrée

Amphibiens	
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Oiseaux	
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Venturon montagnard	<i>Serinus citrinella</i>
Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>
Reptiles	
Lézard vivipare	<i>Lacerta vivipara</i>

Faune invertébrée

Libellules	
Sympetrum jaune	<i>Sympetrum flaveolum</i>
Papillons	
Moiré ottoman	<i>Erebia ottomana tardenota</i>
Damier de la Succise	<i>Euphydryas aurinia</i>
Azuré des moullières	<i>Maculinea alcon</i>

Bibliographie

BAYLE B.

Inventaire des Orchidées d'Ardèche - Bilan provisoire fin 99

39 pages 1999 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

BOUDRIE M.

Les ptéridophytes du département de l'Ardèche (France)

17- pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

BRAUD Y., SCHLEICHER J.

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

12 pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

BROYER J.

Evaluation de l'incidence des mesures agri-environnementales sur l'avifaune prairiale dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002)

15 pages 2002 Consultable : ONCFS

CHABROL L., GAILLARD N., DELMAS S. et al.

Préservation de Maculinea alcon (Lep., Lycaenidae) en Limousin : exemples de gestion écologique

p 2 pages 2001 Consultable : Pôle Relais Tourbières

Conservatoire Botanique National du Massif Central

Etude diagnostic des sites B20, B21 et B26 pro parte inventoriés au titre de la directive 92/43/CEE en Ardèche

28 pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 -

13 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

JULLIAN L.

La tourbière de Sagne-Redonde - plan de gestion

54 pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

LADET A.

Diagnostic faunistique et floristique du secteur "Mont Gerbier de Jonc - Mézenc" : état des connaissances naturalistes

135 pages 1998 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

LAFRANCHIS J.

Le Damier de la Succise

p 1 pages 2003 Consultable : Pôle Relais Tourbières

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

MONCEIX V.

Inventaire des tourbières de la région Rhône-Alpes : département de l'Ardèche

non pages Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

PETETIN A.

Etude diagnostic des sites B20, B21 et B26 pro parte inventoriés au titre de la Directive 92/43/CEE en Ardèche

28 pages 1998 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

ROZIER Y.

Les Maculinea (Lepidoptera, Lycaenidae) des zones humides : l'exemple de la Réserve naturelle du Marais de Lavours (Ain, France)

p 2 pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Suivi Maculinea - Marais des Bidonnes - été 1997

13 pages 1997 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

