



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 26000008

Ancien N° régional : 26370000

## Gorges des Gâts et Forêt du Sapet

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1 605,35 ha

Drôme BOULC, CHATILLON-EN-DIOIS, GLANDAGE, TRESCHENU-CREYERS

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	0
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	2

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 101

### Description et intérêt du site

Après Châtillon-en-Diois, la route du Col de Grimone traverse, entre Mensac et Grimone, de superbes gorges encaissées. Le fond de celles-ci est parcouru par un torrent tumultueux, bordé de boisements d'Aulne blanc. C'est le domaine du Cincle plongeur, également appelé Merle d'eau, qui a la spécialité de marcher au fond du torrent pour se nourrir. Les pentes des gorges sont soulignées par un remarquable ensemble de parois rocheuses calcaires, couvertes de vires et d'anfractuosités, et qui dominent la route et le torrent. Ces gorges abritées montrent des contrastes très marqués entre les versants : pentes chaudes à Thym vulgaire et balmes xérophiles (c'est à dire marquées par des conditions sèches), ubacs très frais avec présence du Sapin pectiné et même de l'Epicéa. Le Piptatère paradoxal, qui trouve ici l'une de ses rares stations de Rhône-Alpes, est une grande herbe des régions méditerranéennes qui pousse dans les gorges en petites colonies disjointes sous les "balmes" sèches et chaudes à la base des falaises, en compagnie d'autres plantes thermophiles (recherchant la chaleur) : le Pistachier térébinthe, le Sumac fustet (ou "Arbre à perruque"), le Thym vulgaire ou le Jasmin buissonnant, qui remontent le long des gorges depuis Châtillon-en-Diois, et se développent sur les expositions les plus chaudes, à l'abri des falaises. La Raiponce de Charmeil fleurit dans les parois calcaires, comme aux abords du Rio Sourd. Le Genévrier thurifère est une autre espèce remarquable des Gorges, témoignage des climats plus chauds de l'ère tertiaire. Des peuplements assez importants de ce genévrier, également appelé Porte-encens, se rencontrent dans toutes les gorges sous les falaises. Il y a quelques années, un beau genévrier se dressait même juste dans un virage en bord de route, mais il a été depuis coupé... Autre espèce thermophile, la Fétuque de Breistroffer est seulement connue dans des gorges très abritées de quelques points des Préalpes. Cette rare espèce endémique du Dauphiné, inscrite au "livre rouge" de la flore menacée en France, recherche des vires rocheuses très ensoleillées. Les falaises des gorges des Gâts sont également le refuge d'espèces animales bien adaptées, comme le Faucon pèlerin, le Hibou Grand-duc ou l'Aigle royal. La prospection des cavités naturelles y a enfin permis la découverte de trois espèces de chauves-souris : le Minioptère de Schreibers, l'Oreillard septentrional et le Grand Rhinolophe.

## Milieus naturels

24.224	FOURRES ET BOIS DES BANCS DE GRAVIERS
32.136	MATTORAL ARBORECENT A JUNIPERUS THURIFEA
44.3	AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS
54.12	SOURCES D'EAU DURE
65	GROTTE

## Flore

Érable de Martin	<i>Acer monspessulanum subsp. martinii</i>
Érable de Montpellier	<i>Acer monspessulanum subsp. monspessulanum</i>
Aethionéma des rochers	<i>Aethionema saxatile (L.) R. Br.</i>
Ail rocambole (Rocambole)	<i>Allium scorodoprasum subsp. scorodoprasum</i>
Alysson champêtre	<i>Alyssum simplex Rudolphi in Schrader</i>
Arabette auriculée	<i>Arabis auriculata Lam.</i>
Cytise argenté	<i>Argyrobolium zanonii (Turra) P.W. Ball</i>
Rapette couchée	<i>Asperugo procumbens L.</i>
Micropus dressé	<i>Bombycilaena erecta</i>
Brome raboteux	<i>Bromus squarrosus L.</i>
Buplèvre du Mont Baldo	<i>Bupleurum baldense</i>
Campanule carillon	<i>Campanula medium L.</i>
Campanule raiponce	<i>Campanula rapunculus L.</i>
Centaurée paniculée	<i>Centaurea paniculata L.</i>
Centranthe à feuilles étroites	<i>Centranthus angustifolius (Miller) DC.</i>
Centranthe Chausse-trape	<i>Centranthus calcitrapa (L.) Dufresne</i>
Linaire velue	<i>Chaenorrhinum villosum (L.) Lange</i>
Cirse de Montpellier	<i>Cirsium monspessulanum</i>
Racine de corail	<i>Corallorrhiza corallorrhiza (L.) Karsten</i>
Sumac fustet	<i>Cotinus coggygria</i>
Cotonéaster du Dauphiné	<i>Cotoneaster delphinensis Chatenier</i>
Croisette du Piémont	<i>Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend.</i>
Sabot de Vénus	<i>Cypripedium calceolus L.</i>
Cytise de Sauze	<i>Cytisus sauzeanus Burnat &amp; Briq.</i>
Daphné des Alpes	<i>Daphne alpina L.</i>
Éillet des rochers	<i>Dianthus sylvestris subsp. sylvestris</i>
Drave des murailles	<i>Draba muralis L.</i>
Echinops à têtes rondes	<i>Echinops sphaerocephalus L.</i>
Epipactis de Müller	<i>Epipactis muelleri Godfery</i>
Panicaud champêtre	<i>Eryngium campestre L.</i>
Fusain à larges feuilles	<i>Euonymus latifolius (L.) Miller</i>
Fétuque de Breistroffer	<i>Festuca breistrofferi Chas, Kerguelen &amp; Plonka</i>
Cotonnière commune	<i>Filago vulgaris Lam.</i>
Fraisier vert	<i>Fragaria viridis Weston</i>
Fumana des montagnes	<i>Fumana ericoides subsp. montana (Pomel) Güemes &amp; Muñoz-Garmendia</i>
Gaïlet à feuilles d'Asperge	<i>Galium corrudifolium Vill.</i>
Gaïlet jaunâtre	<i>Galium obliquum Vill.</i>
Gaïlet grêle	<i>Galium spurium subsp. tenerum (Schleich. ex Gaudin) Kerguelen</i>
Avoine toujours verte	<i>Helictotrichon sempervirens (Vill.) Pilger</i>
Herniaire blanchâtre	<i>Herniaria incana Lam.</i>
Épervière de Lawson	<i>Hieracium lawsonii Vill. gr.</i>
Épervière mouchetée	<i>Hieracium pictum Schleicher ex Pers. gr.</i>
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel</i>
Inule de Suisse	<i>Inula helvetica Weber</i>
Inule des montagnes	<i>Inula montana L.</i>
Genévrier thurifère	<i>Juniperus thurifera L.</i>
Laser de France	<i>Laserpitium gallicum L.</i>

## Faune vertébrée

### Mammifères

Castor d'Europe	<i>Castor fiber</i>
Minioptère de Schreibers	<i>Miniopterus schreibersi</i>
Oreillard septentrional (roux)	<i>Plecotus auritus</i>
Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>

### Oiseaux

Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>

## Faune invertébrée

### Papillons

Petit Agreste	<i>Arethusana arethusana</i>
Azuré de l'Orobe	<i>Meleageria daphnis</i>
Apollon	<i>Parnassius apollo</i>

Gesse noirissante	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.
Limodore à feuilles avortées	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Swartz
Cotonnière des champs	<i>Logfia arvensis</i> (L.) J. Holub
Lunaire vivace	<i>Lunaria rediviva</i> L.
Bugrane naine	<i>Ononis pusilla</i> L.
Orchis pâle	<i>Orchis pallens</i> L.
Raiponce de charmeil	<i>Phyteuma charmelii</i> Vill.
Millet paradoxal	<i>Piptatherum paradoxum</i> (L.) P. Beauv.
Pistachier térébinthe	<i>Pistacia terebinthus</i> L.
Plantain toujours vert	<i>Plantago sempervirens</i> Crantz
Platanthère verdâtre	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Reichenb.
Polystic à aiguillons	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth
Orpin de Nice	<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau
Silène à petites fleurs	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel
Stipe chevelue	<i>Stipa capillata</i> L.
Stipe pennée (Plumet, Marabout)	<i>Stipa pennata</i> L.
Tanaisie en corymbe	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Schultz Bip.
Téléphium d'Imperato	<i>Telephium imperati</i> L.
Trèfle scabre	<i>Trifolium scabrum</i> L.
Trigonelle de Montpellier	<i>Trigonella monspeliaca</i> L.
Trinie glauque	<i>Trinia glauca</i>
Véronique du printemps	<i>Veronica verna</i> L.
Violette suave	<i>Viola suavis</i> M. Bieb.

## Bibliographie

---

### **BRAUD Y., SCHLEICHER J.**

*Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore*

13 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

### **CORA**

*Atlas des Chiroptères de Rhône-Alpes, hors série n°2*

134 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

### **GARRAUD L.**

*Espace Naturel Sensible. Gorges des Gâts. Site de Reychas*

pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

*Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique*

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

### **LAFRANCHIS T.**

*Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles*

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

### **NOBLET J.-F.**

*Le grand rhinolophe en Isère : bilan de quatre années de suivis hivernaux*

29 pages 2002 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

*Un plan d'action pour le Grand Rhinolophe en Isère. Septièmes rencontres nationales "chauves-souris", Bourges*

pages 1999 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

### **ROUE S.Y.**

*Les Chiroptères de la Directive Habitats : le Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)*

p 2 pages 2002 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

### **VINCENT S.**

*Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grotte à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire*

16 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes


*Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grottes à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire*

15 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

**VINCENT S., ISSARTEL G.**

*Inventaire des gîtes cavernicoles d'intérêt majeur pour les chiroptères en région Rhône-Alpes*

42 pages 2005 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



## Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1