



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 26000023

Ancien N° régional : 26790000

## Bois de Taulignan

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 79,51 ha

Drôme SALLES-SOUS-BOIS, TAULIGNAN

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 17

### Description et intérêt du site

Au sud de la Bégude-de-Mazenc, la route franchit le petit col d'Aleyrac avant de redescendre vers Grignan. Entre les villages d'Aleyrac et de Taulignan, le bois de Taulignan couvre les pentes exposées plein sud, entaillées de nombreux ravins plus ou moins profonds, et qui descendent doucement sur la plaine. Ces premiers reliefs au-dessus des plaines sont couverts de boisements méditerranéens de Chêne vert, dégradés sur les pentes les plus rocailleuses en landes à Genévrier oxycèdre (ou Cade), Amélanchier à feuilles ovales, Buis... ou en pelouses à Thym vulgaire. Les ravins, comme celui de Vernonsière, peuvent entailler assez profondément le plateau. Des boisements de hêtres, plus fréquents sur le versant nord, se développent même au fond des plus frais d'entre-eux. Le bois de Taulignan abrite un ensemble d'espèces végétales remarquables liées aux pelouses rocailleuses sur roches dolomitiques. La Sabline agrégée, l'Alysson à feuilles de serpolet et l'Anthémis de Triumphet, sont ainsi très localisés sur des pentes rocailleuses. Le Genêt de Villars, que l'on rencontre sur certaines montagnes des Baronnies, a été découvert ici à moins de 500 m d'altitude sur une crête rocheuse. Le Tabouret précoce, aux fleurs d'un blanc pur, a en France une aire de répartition très localisée aux collines du nord du Tricastin.

## Milieus naturels

34.5	PELOUSES XEROPHILES MEDITERRANEENNES
41.175	HETRAIES CALCICOLES SUB MEDITERRANEENNES
45.3	FORETS DE CHENES VERTS MESO ET SUPRA MEDITERRANEENNES

## Faune vertébrée

### Oiseaux

Alouette lulu

*Lullula arborea*

## Flore

Alysson à feuilles de serpolet	<i>Alyssum serpyllifolium</i> Desf.
Anthémis de Trionfetti	<i>Anthemis triumfetti</i>
Sabline à fleurs en têtes	<i>Arenaria aggregata</i> (L.) Loisel.
Centauree de Trionfetti	<i>Centaurea triumfetti</i>
Genêt de Villars	<i>Genista pulchella</i> subsp. <i>villarsii</i> (G.C. Clementi) Kerguelen
Gesse noirissante	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.
Tabouret précoce	<i>Noccaea praecox</i> (Wulfen) F.K. Meyer
Esparcette des rochers	<i>Onobrychis saxatilis</i> (L.) Lam.
Potentille cendrée	<i>Potentilla cinerea</i> Chaix ex Vill.

## Faune invertébrée

Pas de données disponibles

## Bibliographie

**GARRAUD L.**

*Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique*

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin




Liberté - Égalité - Fraternité  
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°26000023



## Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Ancecy



Echelle : 1 / 25 000  
fonds IGN Scan 25 (C)