



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 26030004

Ancien N° régional :

Vallon des forêts et le plateau de Croix-de-Porte

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 97,83 ha

Drôme PEYRINS, ROMANS-SUR-ISERE, SAINT-BARDOUX

Niveau de connaissance

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|---|------------|---|-------------|---|
| Milieux naturels | 1 | Amphibiens | | Reptiles | 0 | Coléoptères | 0 |
| | | Mammifères | 0 | | | Libellules | 0 |
| Végétaux supérieurs | 2 | Oiseaux | 1 | Crustacés | | Orthoptères | 0 |
| Mousses, lichens | 0 | Poissons | | Mollusques | 0 | Papillons | 0 |

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 13

Description et intérêt du site

Cette zone est située en "Drôme des collines" au nord-ouest de l'agglomération romanaise. Elle remonte le long d'un vallon bordé de bois et de pelouses sableuses, et s'étale au débouché de ce vallon pour inclure le plateau autour de la Croix-de-Porte. La particularité des lieux, situés en arrière plan des Balmes de l'Isère, est liée à son sol sablonneux qui apparaît sur de petites falaises parfois creusées de baumes. Les pentes sablonneuses en bordure des bois sont couvertes de pelouses sèches à la composition variée (Immortelle jaune, Héliantheme des Apennins aux fleurs blanches, Euphorbe de Seguiet, Thym précoce...), auxquelles succèdent des formations denses de Ciste à feuilles de sauge. Localement, les sables mis à nu favorisent le développement d'espèces annuelles (Silène conique, céraistes, vesces, Vulpie ciliée...). Le plateau autour de Croix-de-Porte est couvert de cultures sur des sols sablonneux. Certains champs peu traités permettent l'observation d'une flore messicole assez variée, comprenant Bleuet, Nielle des blés, Miroir de Vénus, Coquelicot, ou même l'Ornithogale penché, protégé en région Rhône-Alpes et relativement bien représenté dans les champs et sur les bords de route de ce secteur. Le chant de la Caille des blés retentit dans les champs, et le Guêpier niche en petits groupes dans les petites falaises de sables.

Milieus naturels

| | |
|-------|-------------------------------|
| 34.12 | PELOUSES DES SABLES CALCAIRES |
| 34.41 | LISIERES XERO THERMOPHILES |
| 82.3 | CULTURES EXTENSIVES |

Faune vertébrée

Oiseaux

| | |
|------------------|--------------------------|
| Caille des blés | <i>Coturnix coturnix</i> |
| Guêpier d'Europe | <i>Merops apiaster</i> |

Flore

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Nielle des blés | <i>Agrostemma githago L.</i> |
| Ciste à feuilles de sauge | <i>Cistus salviifolius L.</i> |
| Ornithogale penchée | <i>Ornithogalum nutans L.</i> |
| Fléole des sables | <i>Phleum arenarium L.</i> |
| Silène conique | <i>Silene conica L.</i> |

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

BROYER J.

Evaluation de l'incidence des mesures agri-environnementales sur l'avifaune prairiale dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002)

15 pages 2002 Consultable : ONCFS

GARRAUD L.

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique


925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
ET DU TERRAIN

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°26030004



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)