



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 26040016

Ancien N° régional :

Prairie humide de l'Oursière

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 14,51 ha

Isère

ROYBON

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux sucoériers	1	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 5

Description et intérêt du site

L'originalité du pays de Chambaran, au sein du Bas-Dauphiné réside dans son substrat géologique, qui n'a pas d'équivalent dans les régions alpines françaises : la glaise à quartzite. Celle-ci donne des sols très pauvres, plus ou moins acides, recouverts à l'état naturel par une chênaie mixte à Molinie bleue, parcourue par des vallons frais tourbeux à sphaignes. Cette particularité géologique liée à la position biogéographique du Chambaran, en limite d'influence atlantique, explique la présence de nombreuses plantes rares, en limite orientale de leur aire de répartition géographique. Les espèces atlantiques trouvent refuge ici dans les prairies et landes humides issues du défrichement de la forêt et dans les vallons frais, tout comme certaines espèces montagnardes trouvent ici refuge à basse altitude. La prairie humide de l'Oursière abrite ainsi plusieurs espèces remarquables. On y rencontre l'Orchis à fleurs lâches. Le nom de cette orchidée fait allusion à l'aspect de l'inflorescence. Sa floraison très contrastée (d'un rouge-violet foncé avec la partie centrale blanche et non maculée) a lieu vers Pentecôte. La Laïche pauciflore est une espèce assez rare en région Rhône-Alpes. On distingue facilement ses épillets effilés d'un roux très clair piquetant le vert franc de la tourbière. Son inflorescence est pauvre en fleurs, d'où son nom : elle présente seulement une ou deux fleurs mâles au sommet, et deux ou trois fleurs femelles à la base. Enfin, le Carum à feuilles verticillées est une plante à répartition occidentale, qui affectionne les prairies humides acides ; contrairement à ceux de sa cousine, l'Anis des Vosges, ses fruits ne sont pas aromatiques.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Laïche pauciflore	<i>Carex pauciflora</i> Lighft.
Orchis à fleurs lâches	<i>Orchis laxiflora</i> Lam.

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

GARRAUD L.
Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique
925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin


MERLE H.
Inventaire des milieux naturels et de la flore du territoire du Syndicat mixte Bièvre-Valloire
5p. pages 2004 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et de l'Énergie
Ministère de l'Environnement
et du Territoire
Ministère de l'Énergie

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°26040016



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)