



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 26050005

Ancien N° régional :

Pelouses des Jacots et combe de Maldina

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 21,18 ha

Drôme

ORIOLE-EN-ROYANS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens		Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	0	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 17

Description et intérêt du site

Cette zone naturelle est située dans le Royans, sous les pentes est de la montagne de Musan, au nord-ouest du village d'Oriol-en-Royans. Elle comprend deux ensembles écologiques remarquables : une prairie sèche couverte d'espèces méridionales, et une combe très humide indiquant au contraire un microclimat soumis aux influences atlantiques. La pelouse calcaire piquetée d'arbustes est un milieu riche en orchidées. Vingt-six espèces y ont été dénombrées à ce jour, dont l'Orchis à trois dents, l'Epipactis de Mueller, le Limodore à feuilles avortées et le Spiranthe d'automne. La découverte récente de quelques pieds de Genévrier thurifère confirme pleinement son intérêt naturaliste. Cet arbuste, qui serait une espèce relique des périodes plus chaudes de l'ère tertiaire, est surtout présent dans la Drôme sous les falaises ensoleillées du Diois et des Baronnies. La station d'Oriol-en-Royans, l'une des plus septentrionale du département, annonce en quelque sorte déjà les rares stations grenobloises. Cette prairie sèche contraste singulièrement avec la petite combe fraîche et humide de la base de la montagne de Musan. Remarquable par sa grande diversité en fougères, cette dernière abrite un certain nombre d'espèces rares comme le Dryopteris écailléux. Cette grande fougère, proche de la fougère mâle, est particulièrement exigeante quant à l'humidité atmosphérique. Elle la rencontre surtout dans les régions tempérées fortement arrosées. La combe de Maldina constituerait la seule station connue actuellement, en France, à l'est du Rhône.

Milieux naturels

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Centauree paniculée	<i>Centaurea paniculata</i> L.
Epipactis à petites feuilles	<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Swartz
Epipactis de Müller	<i>Epipactis muelleri</i> Godfery
Panicaud champêtre	<i>Eryngium campestre</i> L.
Gaillet jaunâtre	<i>Galium obliquum</i> Vill.
Genévrier thurifère	<i>Juniperus thurifera</i> L.
Limodore à feuilles avortées	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Swartz
Myosotis versicolore	<i>Myosotis discolor</i> Pers.
Orchis à trois dents	<i>Orchis tridentata</i> Scop.
Polystic à aiguillons	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth
Polystic à dents sétacées	<i>Polystichum setiferum</i> (Forsskål) Woyнар
Spiranthe d'automne	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.
Trèfle scabre	<i>Trifolium scabrum</i> L.

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

GARRAUD L.
Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique
925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin


JULLIAN L.
La tourbière de Sagne-Redonde - plan de gestion
54 pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et de l'Aménagement
du Territoire

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°26050005



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)