



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 26050007

Ancien N° régional : 26974704

Plateau de Chauméane

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 164,65 ha

Drôme

COMBOVIN

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	3	Reptiles	2	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	3	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 8

Description et intérêt du site

Cette zone est située dans la partie méridionale du Vercors, au sud-est de Chabeuil. Un peu à l'ouest du col des Limouches, une petite route part vers le sud dans un virage, en direction de Gigors-et-Lozeron, et traverse deux kilomètres plus loin cette portion du plateau de Choméane. L'altitude varie de 830 à 950 m. La végétation est ici composée de prairies de fauche alternant avec des bosquets et boisements de Pin sylvestre, Chêne pubescent et Hêtre, accompagnés de nombreux arbustes (Buis, Amélanchier à feuilles ovales, genévriers, pruniers...) ; il s'agit de milieux relativement chauds, malgré l'altitude et en raison de l'inclinaison générale du plateau vers le sud. La flore présente donc un caractère thermophile (avec des espèces recherchant la chaleur), ce que l'on remarque notamment à travers l'abondance des orchidées. Dans cette famille spectaculaire, citons plus particulièrement l'Ophrys abeille, l'Orchis de Provence aux fleurs jaune en épi, et l'Orchis à trois dents. Deux catégories animales, les oiseaux et les amphibiens, ont été plus particulièrement étudiés sur le plateau. La Pie-grièche écorcheur, qui niche sur ce plateau, caractérise la structure bocagère de la végétation. On peut la voir perchée à l'affût sur les buissons. L'Alouette des champs et l'Alouette lulu sont toutes deux présentes, la première sur des parcelles ouvertes (pelouses, cultures), la seconde plutôt sur des landes boisées. Trois espèces d'amphibiens fréquentent les quelques milieux humides du plateau : le Crapaud commun, la Grenouille rousse et le Pélodyte ponctué. La découverte du Pélodyte ponctué dans une mare à plus de 900 m d'altitude est assez remarquable puisqu'il s'agit de l'un des records d'altitude connus pour cette espèce.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Amphibiens

Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>
Pélodyte ponctué	<i>Pelodytes punctatus</i>
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>

Oiseaux

Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>

Flore

Orchis de Provence	<i>Orchis provincialis Balbis ex DC.</i>
Orchis à trois dents	<i>Orchis tridentata Scop.</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

CORA

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1
146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

GARRAUD L.

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique
925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin


NOBLET J.-F.

Record altitudinal pour le pélogyte ponctué en Isère (Pelodytes punctatus)
pages 2000 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

PONT B., MERCIER J.L., PISSAVIN S.

Inventaire et gestion des amphibiens de la réserve naturelle de l'île de la Platière
26 pages 1997 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°26050007



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)