Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : **26080001**

Ancien N° régional :

Marais du Chaumas

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 10,12 ha

Drôme VASSIEUX-EN-VERCORS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **3**

Description et intérêt du site

Ce petit marais tourbeux est situé à 1100 m d'altitude, dans une pâture, au sud-est du village de Vassieux-en-Vercors, utilisée par des bovins et des chevaux. Une végétation de marais entoure un petit plan d'eau libre, plus particulièrement un milieu tourbeux à Laîche de Daval et une zone de "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) à Jonc compresséCette petite zone humide, bien qu'appauvrie par le surpâturage des abords et le drainage en aval, abrite deux espèces animales remarquables parmi les insectes et les oiseaux : le Cuivré des marais, et la Pie-grièche écorcheur. Le Cuivré des marais est un papillon diurne. Le mâle se distingue de la femelle par ses ailes rouge doré bordées de noir dessus. Il possède aussi une forme en virgule sur la face supérieure de ses deux paires d'ailes. Ce caractère, mais aussi le fait qu'ils aient tous deux des ailes postérieures gris bleuté dessous, permettent de les différencier des autres cuivrés. La femelle pond ses œufs sur les oseilles sauvages rencontrées dans ces milieux humides. Une grosse chenille verte en sort après quelques jours d'incubation, et se nourrit de leurs feuilles. Au bout de quelques semaines, elle forme une chrysalide, la métamorphose donnant ce superbe papillon. Cette espèce rare dans la Drôme est menacée localement. La disparition des milieux humides par drainage, notamment, en est une des raisons.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Caille des blés	*Coturnix coturnix*
Pie-grièche écorcheur	*Lanius collurio*

Flore

Trèfle marron	*Trifolium spadiceum L.*

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

BROYER J.

Evaluation de l'incidence des mesures agri-environnementales sur l'avifaune prairiale dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002)

15 pages 2002 Consultable : ONCFS

GARRAUD L.

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°26080001



Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

N

Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)