



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 26090013

Ancien N° régional :

Détroit de Saillans

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 16,93 ha

Drôme ESPENEL, SAILLANS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens		Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	0
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 12

Description et intérêt du site

Cette zone est située au-dessus de la rivière Drôme, entre Saillans et Espenel. Une grande barre calcaire et verticale, sillonnée de nombreuses vires où s'accrochent les Genévriers de Phénicie, est exposée au sud-est au-dessus de la route de Die. Elle se prolonge en contrebas par une forte pente rocailleuse et instable, couverte d'une pelouse maigre colonisée de buissons et de petits chênes, qui plonge sur la route. Cette zone, exposée à l'ardeur du soleil et bien abritée des vents, est colonisée par un ensemble de plantes capables de résister à la chaleur et la sécheresse, qui parviennent ici en limite nord de leur aire de répartition géographique. C'est le cas de la Petite Mélisse, de la Jacinthe tardive, de la Biscutelle à feuilles de chicorée, de l'Iris nain, du Mélilot de Naples... La Jacinthe tardive une espèce méditerranéenne espagnole, qui déborde en France par les Pyrénées orientales, et se retrouve dans la Drôme sur un ensemble de stations localisées sous des barres rocheuses exposées au sud. Le détroit de Saillans constitue ainsi l'une de ses limites septentrionales. L'Iris nain est un petit iris sauvage des garrigues et montagnes provençales. La Biscutelle à feuilles de chicorée, méditerranéenne et protégée en région Rhône-Alpes, agrément de ses fleurs jaunes les pentes rocailleuses. Le Grand-duc d'Europe a élu domicile dans la paroi rocheuse, et les Chamois fréquentent avec aisance ces pentes instables au-dessus de la route.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Mammifères

Chamois *Rupicapra rupicapra*

Oiseaux

Grand-duc d'Europe *Bubo bubo*

Flore

Doradille des sources	<i>Asplenium fontanum (L.) Bernh.</i>
Lunetière à feuilles de chicorée	<i>Biscutella cichoriiifolia Loisel.</i>
Crupine commune	<i>Crupina vulgaris Cass.</i>
Dipcadi tardif	<i>Dipcadi serotinum (L.) Medik.</i>
Iris nain	<i>Iris lutescens Lam.</i>
Jasmin buissonnant	<i>Jasminum fruticans L.</i>
Genévrier de Phénicie	<i>Juniperus phoenicea L.</i>
Mélique pyramidale	<i>Melica minuta L.</i>
Mélilot de Naples	<i>Melilotus neapolitanus Ten.</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

GARRAUD L.

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique


925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°26090013



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)