



## Montagnes de Toussière et de la Pare, de la Varaimé, Quigouret et mont Chauvet

**Départements et communes concernées en Rhône-Alpes**

**Surface : 1 540,75 ha**

**Drôme** BOULC, GLANDAGE, LUS-LA-CROIX-HAUTE, VAL-MARAVEL

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	0	Reptiles	1	Coléoptères	0
Végétaux supérieurs	2	Mammifères	1	Crustacés		Libellules	0
Mousses, lichens	0	Oiseaux	3	Mollusques	0	Orthoptères	0
		Poissons				Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **113**

### Description et intérêt du site

Cette zone englobe une ligne de montagnes qui s'étend entre le col de Grimone et le col de Cabre, et forme une limite géographique entre le Haut-Diois (Drôme) et le Bochaîne (Hautes-Alpes). Au nord de cet ensemble, le massif de La Pare et de Toussière culmine à près de 2000 m d'altitude en face du Jocou. La montagne de Varaimé, soulignée en versant sud par une belle falaise, sépare la vallée de Boulc-en-Diois de celle du hameau des Tatins. Les secteurs de pâturages se prolongent au sud vers la montagne de Quigouret, et suivent la crête jusqu'à la montagne de Luzet, au-dessus de Val-Maravel. Cet ensemble comprend des milieux montagnards variés, transition entre les Alpes du nord et les Alpes du sud. Les montagnes les plus hautes héritent d'espèces des hautes montagnes (Lagopède alpin, Perdrix bartavelle, Tichodrome échelette, Chocard à bec jaune ...). Les montagnes méridionales sont couvertes de pâturages plus secs et rocheux, avec l'Anthyllis des montagnes, les hélianthes... Au début du printemps, les pâturages se couvrent par endroit des corolles veloutées de la Pulsatille de Haller. Ces milieux ouverts permettent la nidification d'oiseaux comme l'Alouette des champs, le Pipit spioncelle et, localement, le Pipit rousseline. Le Traquet motteux et le Merle de roche nichent dans des pâturages rocheux. Les pelouses sommitales sont des terrains de chasse régulièrement parcourus par l'Aigle royal, à la recherche de proies variées, comme peut-être la Marmotte. Ce rongeur, répandu dans les grandes Alpes, est présent seulement sur les flancs de la montagne de Toussière. Les éboulis de ces hautes montagnes sont des habitats naturels remarquables abritant des espèces rares, comme la Campanule des Alpes ou le Chardon de Bérard. Cette dernière espèce est une endémique (c'est à dire dont l'aire de répartition est limitée à une zone géographique restreinte) franco-italienne propre au sud-ouest des Alpes. Elle est liée aux éboulis des hautes montagnes, du Vercors aux Alpes maritimes. Cet ensemble de montagne, pâturages, milieux forestiers et milieux rocheux, présente ainsi un intérêt majeur pour la faune et la flore de montagne.

# Milieus naturels

61.2

EBOULIS CALCAIRES ALPINS

## Flore

Aconit anthora	<i>Aconitum anthora</i> L.
Androsace de Chaix	<i>Androsace chaixii</i> Gren. & Godron
Cerfeuil des prés	<i>Anthriscus sylvestris</i> subsp. <i>alpina</i>
Arabette scabre	<i>Arabis scabra</i> All.
Doradille des sources	<i>Asplenium fontanum</i> (L.) Bernh.
Chardon de berard	<i>Berardia subacaulis</i>
Brome de Hongrie var.	<i>Bromus pannonicus</i> subsp. <i>monocladus</i> (Domin) P.M. Sm.
Campanule des Alpes	<i>Campanula alpestris</i> All.
Carline à feuilles d'acanthé	<i>Carlina acanthifolia</i>
Cirse tubéreux	<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All.
Cotonéaster du Dauphiné	<i>Cotoneaster delphinensis</i> Chatenier
Sabot de Vénus	<i>Cypripedium calceolus</i> L.
Cytise de Sauze	<i>Cytisus sauzeanus</i> Burnat & Briq.
Œillet de Montpellier	<i>Dianthus hyssopifolius</i> L.
Œillet des rochers	<i>Dianthus sylvestris</i> subsp. <i>sylvestris</i>
Epipactis à labelle étroit	<i>Epipactis leptochila</i> (Godfery) Godfery
Epipactis de Müller	<i>Epipactis muelleri</i> Godfery
Panicaud blanche épine	<i>Eryngium spinalba</i>
Vélar jaunâtre	<i>Erysimum ochroleucum</i> (Schleicher) DC.
Fritillaire du Dauphiné	<i>Fritillaria tubiformis</i> Gren. & Godron
Gagée jaune	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker-Gawler
Gagée des prés	<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort.
Gaillet à feuilles d'asperge	<i>Galium corradifolium</i> Vill.
Gaillet jaunâtre	<i>Galium obliquum</i> Vill.
Gaillet des Alpes occidentales	<i>Galium pseudohelveticum</i> Ehrend.
Hélianthème des Apennins	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Miller
Avoine toujours verte	<i>Helictotrichon sempervirens</i> (Vill.) Pilger
Avoine soyeuse	<i>Helictotrichon setaceum</i> (Vill.) Henrard
Millepertuis à feuilles d'Hysope	<i>Hypericum hyssopifolium</i> Chaix
Koelérie à grandes fleurs	<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schultes
Laser de France	<i>Laserpitium gallicum</i> L.
Limodore à feuilles avortées	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Swartz
Pyrole à une fleur	<i>Moneses uniflora</i> (L.) A. Gray
Bugrane buissonnante	<i>Ononis fruticosa</i> L.
Bugrane striée	<i>Ononis striata</i> Gouan
Orchis de Spitzel	<i>Orchis spitzelii</i> Sauter ex Koch
Oxytropis couleur d'améthyste	<i>Oxytropis amethystea</i> Arvet-Touvet
Pédiculaire chevelue	<i>Pedicularis comosa</i> L.
Plantain serpentant	<i>Plantago maritima</i> subsp. <i>serpentina</i> (All.) Arcangeli
Polygale des sols calcaires	<i>Polygala calcarea</i> F.W. Schultz
Pulsatille de Haller	<i>Pulsatilla halleri</i> (All.) Willd.
Pyrole à feuilles rondes	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.
Saxifrage silonnée	<i>Saxifraga exarata</i> subsp. <i>delphinensis</i> (Ravaud) Kerguelen
Saxifrage à bulbilles	<i>Saxifraga granulata</i> L.
Joubarbe des terrains calcaires	<i>Sempervivum calcareum</i> Jordan
Serratule à tige nue	<i>Serratula nudicaulis</i> (L.) DC.
Tanaisie en corymbe	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Schultz Bip.
Trinie glauque	<i>Trinia glauca</i>
Trochiscanthe nodiflore	<i>Trochiscanthes nodiflora</i>

# Faune vertébrée

## Mammifères

Cerf élaphe	<i>Cervus elaphus</i>
Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>

## Oiseaux

Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Perdrix bartavelle	<i>Alectoris graeca</i>
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Lagopède alpin	<i>Lagopus mutus</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Merle de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Chocard à bec jaune	<i>Pyrhocorax graculus</i>
Venturon montagnard	<i>Serinus citrinella</i>
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>

## Reptiles

Lézard vivipare	<i>Lacerta vivipara</i>
-----------------	-------------------------

# Faune invertébrée

## Papillons

Hermite	<i>Chazara briseis</i>
Azuré de la Croisette	<i>Maculinea rebeli</i>
Apollon	<i>Parnassius apollo</i>
Semi Apollon	<i>Parnassius mnemosyne</i>

Tulipe méridionale	<i>Tulipa australis</i> Link
Tulipe méridionale	<i>Tulipa sylvestris</i> subsp. <i>australis</i> (Link) Pamp.
Valériane tubéreuse	<i>Valeriana tuberosa</i> L.
Véronique du printemps	<i>Veronica verna</i> L.
Violette des rochers	<i>Viola rupestris</i> F.W. Schmidt

## Bibliographie

---

### **BETTINELLI L., MORA F.**

*Plan d'action en faveur de l'Azuré de la Croisette (Maculinea rebeli) en Franche-Comté*

18 pages 2004 Consultable : Pôle Relais Tourbières

### **BRAUD Y., SCHLEICHER J.**

*Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore*

13 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

### **CORA**

*Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes*

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

### **CORA Drôme**

*Oiseaux de la Drôme*

312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

### **CRAPLET L.**

*Suivi de population de Maculinea alcon rebeli (Azuré de la Croisette) (Lepidoptera, Rhopalocera)*

23 pages 1997 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

### **GARRAUD L.**

*Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique*

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

### **LAFRANCHIS T.**


*Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles*

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

### **Parc Naturel Régional du Vercors**

*Site I27 "Landes, pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux des Hauts Plateaux du Vercors et de la bordure orientale du Vercors" - Document d'objectifs*


102 pages 2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



## Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1



**Légende**  
 Périimètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

