



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 26120001

Ancien N° régional : 26125302,26125303,26125304,26125301

Montagne de Couspeau

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 2 206,06 ha

Drôme

LES TONILS, SAINT-NAZAIRE-LE-DESERT, BEZAUDUN-SUR-BINE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux sucoérieurs	2	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 58

Description et intérêt du site

La montagne de Couspeau est formée d'un anticlinal qui dessine une longue crête dénudée orientée nord-sud. Sur ses versants, les contrastes sont très marqués entre la végétation xérophile (recherchant la sécheresse) de hêtraie-chênaie méditerranéenne, et la végétation montagnarde avec la hêtraie-sapinière relique de la forêt de Rochefourchat. La montagne de Couspeau se révèle être un site très intéressant pour les formations végétales de pelouses. Les landes de la Montagne de Couspeau recèlent de passereaux remarquables, des espèces montagnardes (Pipit spioncelle et Traquet motteux) et des espèces méditerranéennes (Pipit rousseline, Fauvette pitchou et Fauvette orphée). Le site abrite aussi une petite population de Chamois. La crête de la montagne de Couspeau assure le lien entre la montagne d'Angèle (région des Baronnies) et les Trois-Becs de la forêt de Saoû. Les prairies sont pâturées par un troupeau d'ovins en estive. Sur le versant nord de la montagne de Couspeau, au nord-est du Grand Delmas, une belle hêtraie-sapinière relique, la forêt de Rochefourchat, a subsisté. On peut encore y admirer quelques très vieux arbres. Cette forêt est située dans un petit vallon frais entre 1150 et 1400 m d'altitude. Les botanistes signalent ici des formations végétales de qualité, liées à ce milieu forestier plutôt rare dès que l'on s'avance dans le midi de la France. Dans ce type de boisement, les vieux arbres peuvent offrir des cavités propices à la reproduction d'espèces remarquables, comme certains oiseaux cavernicoles et des coléoptères sapro-xylophages. La Chouette de Tengmalm se reproduit dans cette forêt. Les populations animales et végétales sont en lien avec les boisements de même type que l'on trouve dans la forêt de Saoû : Trois Becs, Grande Combe et Grand Pommerol. Le vallon marneux des sources de la Courance forme une petite zone humide située à l'est du col de la Chaudière. Les pentes marno-argileuses sont un élément important dans le paysage du Diois et des Baronnies. Elles correspondent à des formations géologiques qui se sont formées dans la "fosse Voconciennne" à l'ère secondaire. Sur le plan écologique, se sont des écosystèmes dynamiques caractérisés par l'imperméabilité du substrat et la mobilité de la marne. L'érosion et les glissements de terrain sont les composantes principales de la dynamique de telles formations. Cette dynamique est favorable à l'"auto-entretien" des micro-zones humides qui peuvent se créer dans le vallon. Le site a été identifié pour sa grande richesse entomologique, notamment pour les papillons diurnes.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Flore

Achillée tomenteuse	<i>Achillea tomentosa</i> L.
Aconit tue-loup	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>vulparia</i> (Reichenb. ex Sprengel) Nyman
Androsace de Chaix	<i>Androsace chaixii</i> Gren. & Godron
Buplèvre des rochers	<i>Bupleurum petraeum</i> L.
Centaurée tachetée	<i>Centaurea maculosa</i>
Centaurée de Trionfetti	<i>Centaurea triumfetti</i>
Œillet de Grenoble	<i>Dianthus gratianopolitanus</i> Vill.
Epipactis à petites feuilles	<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Swartz
Panicaut blanche épine	<i>Eryngium spinalba</i>
Avoine soyeuse	<i>Helictotrichon setaceum</i> (Vill.) Henrard
Millepertuis à feuilles d'Hysope	<i>Hypericum hyssopifolium</i> Chaix
Genévrier thurifère	<i>Juniperus thurifera</i> L.
Bugrane striée	<i>Ononis striata</i> Gouan
Ophrys de Bertoloni (Ophrys de la Drôme)	<i>Ophrys bertolonii</i> Moretti
Ophrys de la Drôme	<i>Ophrys drumana</i> Delforge
Orchis à trois dents	<i>Orchis tridentata</i> Scop.
Pivoine officinale	<i>Paeonia officinalis</i> L.
Pivoine velue	<i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>huthii</i> Soldano [1993]
Saxifrage silonnée	<i>Saxifraga exarata</i> subsp. <i>delphinensis</i> (Ravaud) Kerguélen
Joubarbe des terrains calcaires	<i>Sempervivum calcareum</i> Jordan
Serratule à tige nue	<i>Serratula nudicaulis</i> (L.) DC.
Tulipe méridionale	<i>Tulipa australis</i> Link

Faune vertébrée

Oiseaux

Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Merle de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>
Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i>
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>

Faune invertébrée

Papillons

Hermite	<i>Chazara briseis</i>
Damier de la Succise	<i>Euphydryas aurinia</i>
Apollon	<i>Parnassius apollo</i>
Proserpine	<i>Zerynthia rumina</i>
Zygène cendré	<i>Zygaena rhadamanthus</i>

Bibliographie

BRAUD Y., SCHLEICHER J.

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

12 pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

13 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 -

13 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007

Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74

CORA Drôme

Oiseaux de la Drôme

312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GARRAUD L.

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

LAFRANCHIS J.

Le Damier de la Succise

p 1 pages 2003 Consultable : Pôle Relais Tourbières

LAFRANCHIS T.


Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

TYSSANDIER P.

La Fauvette orphée (Sylvia hortensis) en France


p 1 pages 1991 Consultable : CORA Région



Légende




Périmètre de la ZNIEFF type 1



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy