

CHAINONS DU DIOIS CENTRAL

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 19 619 ha

Drôme

AIX-EN-DIOIS, ARNAYON, AUCELON, AUREL, BARNAVE, BARSAC, BELLEGARDE-EN-DIOIS, BRETTE, CHALANCON, DIE, JONCHERES, MONTLAUR-EN-DIOIS, MONTMAUR-EN-DIOIS, LA MOTTE-CHALANCON, PENNES-LE-SEC, PONET-ET-SAINT-AUBAN, POYOLS, PRADELLE, RECOUBEAU-JANSAC, RIMON-ET-SAVEL, SAINT-NAZAIRE-LE-DESERT, VOLVENT,

ZNIEFF de type I concernées par cette zone

26130001,26130002,26130003,26130004,26130005

Description et intérêt du site

Dès le passage du col du Rousset, les traits déjà méridionaux du Diois offrent un contraste saisissant avec le climat montagnard du Vercors central. Silloné par la Drôme et dominé par l'imposant massif du Glandasse, le Diois peut être considéré comme l'une des portes de la Provence. La lavande y est, avec la vigne, l'une des cultures traditionnelles.

Le vaste ensemble décrit ici délimite les chaînons du Diois central, au sud de la vallée de la Drôme et de la ville de Die.

A l'image des reliefs situés plus à l'ouest (Forêt de Saou et Couspeau...), les formations végétales méditerranéennes sont ici dominantes, mais l'altitude autorise le développement d'un important étage supra-méditerranéen marqué par la présence de hêtraies.

Il présente un grand intérêt botanique (avec des stations de plantes particulièrement rares, telles que la Pivoine officinale, et de nombreuses espèces des Alpes du sud parvenant ici en limite d'aire : Cotonéaster du Dauphiné, Cytise de Sauze, Fritillaire du Dauphiné...) et faunistique (notamment ornithologique, par exemple en ce qui concerne les oiseaux rupicoles, et entomologique).

Une telle diversité va de pair avec la variété des expositions et des formations végétales représentées.

Le secteur abrite enfin un karst caractéristique des Préalpes du sud. Ce type de karst est caractérisé par sa discontinuité, du fait des mouvements tectoniques, des variations de faciès et de l'érosion intervenue durant la période miocène.

Le peuplement faunistique du karst du Diois est relativement bien connu. certaines espèces (par exemple un coléoptère tréchiné) sont des endémiques dont la répartition est circonscrite au Vercors et au Diois.

Le zonage de type II souligne l'unité de cet ensemble au sein duquel les secteurs abritant les habitats ou les espèces les plus remarquables sont retranscrits par plusieurs vastes zones de type I (principaux massifs, bois, pelouses ou cours d'eau...).

Il illustre également les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales (dont celles précédemment citées), en tant que zone d'alimentation ou de reproduction pour plusieurs espèces remarquables (dont certaines exigeant par ailleurs de vastes territoires vitaux, telles que l'Aigle royal), qu'il s'agisse d'oiseaux (des Cassenoix moucheté ou Venturon montagnard des sommets jusqu'aux fauvettes méditerranéennes et au Moineau soulcie...), mais aussi de mammifères (Castor d'Europe, colonies importantes de Chamois, chiroptères...), de batraciens (crapaud Sonneur à ventre jaune), d'insectes (papillons Apollon, Pique-prune, Proserpine...) ou de poissons (Barbeau méridional).

Le Tétras-lyre parvient ici en de son aire de répartition ; ses effectifs subissent néanmoins localement une diminution rapide, probablement imputable à la modification des habitats favorables à l'espèce.

Le zonage souligne également le bon état de conservation général de certains bassins versants, en rapport avec le maintien de populations d'Ecrevisse à pattes blanches, espèce réputée pour sa sensibilité particulière vis à vis de la qualité du milieu. Cette écrevisse indigène est devenue rare dans la région, tout spécialement à l'est de la vallée du Rhône.

En ce qui concerne les secteurs karstiques, la sur-fréquentation des grottes, le vandalisme des concrétions peuvent de plus rendre le milieu inapte à la vie des espèces souterraines. Les aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions accidentelles ou découlant de l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture intensive.

L'ensemble présente par ailleurs un intérêt paysager et biogéographique, compte-tenu de la cohabitation souvent insolite d'animaux ou de plantes appartenant aux domaines montagnard et méditerranéen.

Milieux naturels

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES

Flore

Aconit tue-loup	<i>Aconitum lycoctonum subsp. vulparia</i> (Reichenb. ex Sprengel) Nyman
Alysson champêtre	<i>Alyssum simplex Rudolphi in Schrader</i>
Arabette nouvelle	<i>Arabis nova Vill.</i>
Asperge à feuilles étroites	<i>Asparagus tenuifolius Lam.</i>
Doradille des sources	<i>Asplenium fontanum (L.) Bernh.</i>
Astragale blanchâtre	<i>Astragalus incanus L.</i>
Lunetière à feuilles de chicorée	<i>Biscutella cichoriifolia Loisel.</i>
Micropus dressé	<i>Bombycilaena erecta</i>
Campanule des Alpes	<i>Campanula alpestris All.</i>
Centaurée de Trionfetti var.	<i>Centaurea triumfetti subsp. semidecurrens</i>
Centaurée de Trionfetti var.	<i>Centaurea triumfetti subsp. triumfetti</i>
Cirse de Montpellier	<i>Cirsium monspessulanum</i>
Cotonéaster du Dauphiné	<i>Cotoneaster delphinensis Chatenier</i>
Crocus bigarré (Crocus de Crest)	<i>Crocus versicolor Ker-Gawler</i>
Croisette du Piémont	<i>Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend.</i>
Crupine commune	<i>Crupina vulgaris Cass.</i>
Cytise de Sauze	<i>Cytisus sauzeanus Burnat & Briq.</i>
Daphné camélé	<i>Daphne cneorum L</i>
Œillet de Grenoble	<i>Dianthus gratianopolitanus Vill.</i>
Echinops à têtes rondes	<i>Echinops sphaerocephalus L.</i>
Fusain à larges feuilles	<i>Euonymus latifolius (L.) Miller</i>
Fraisier vert	<i>Fragaria viridis Weston</i>
Fritillaire du Dauphiné	<i>Fritillaria tubiformis Gren. & Godron</i>
Gaillet grêle	<i>Galium spurium subsp. tenerum (Schleich. ex Gaudin) Kerguélen</i>
Genêt de Villars	<i>Genista pulchella subsp. villarsii (G.C. Clementi) Kerguélen</i>
Orchis odorant	<i>Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard</i>
Avoine soyeuse	<i>Helictotrichon setaceum (Vill.) Henrard</i>
Epervière tomenteuse	<i>Hieracium tomentosum L. [1755]</i>
Millepertuis à feuilles d'Hysope	<i>Hypericum hyssopifolium Chaix</i>
Ibérís penné	<i>Iberis pinnata L.</i>
Ibérís des rochers	<i>Iberis saxatilis L.</i>
Iris nain	<i>Iris lutescens Lam.</i>
Genévrier de Phénicie	<i>Juniperus phoenicea L.</i>
Genévrier sabine	<i>Juniperus sabina L.</i>
Genévrier thurifère	<i>Juniperus thurifera L.</i>
Laitue vireuse	<i>Lactuca virosa L.</i>
Gesse blanchâtre	<i>Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides (Gouan) Bässler</i>
Bugrane striée	<i>Ononis striata Gouan</i>
Orchis de Provence	<i>Orchis provincialis Balbis ex DC.</i>
Pivoine officinale	<i>Paeonia officinalis L.</i>
Pivoine velue	<i>Paeonia officinalis subsp. huthii Soldano [1993]</i>
Raiponce de charmeil	<i>Phyteuma charmelii Vill.</i>
Plantain argenté	<i>Plantago argentea Chaix</i>
Pulsatille de Haller	<i>Pulsatilla halleri (All.) Willd.</i>
Renoncule de Montpellier	<i>Ranunculus monspeliacus L.</i>
Saxifrage silonnée	<i>Saxifraga exarata subsp. delphinensis (Ravaud) Kerguélen</i>
Joubarbe des terrains calcaires	<i>Sempervivum calcareum Jordan</i>
Séneçon doria	<i>Senecio doria L.</i>
Silène des forêts	<i>Silene nemoralis Waldst. & Kit.</i>
Silène à petites fleurs	<i>Silene otites (L.) Wibel</i>
Grande Tordyle	<i>Tordylium maximum L.</i>
Valérianelle dentée	<i>Tulipa australis Link</i>
Véronique précoce	<i>Valerianella dentata (L.) Pollich</i>
Violette admirable	<i>Veronica praecox All.</i>
	<i>Viola mirabilis L.</i>

Faune vertébrée

Amphibien

Sonneur à ventre jaune	<i>Bombina variegata</i>
Mammifère	
Castor d'Europe	<i>Castor fiber</i>
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>
Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>

Oiseau

Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Bruant proyer	<i>Miliaria calandra</i>
Merle de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>
Venturon montagnard	<i>Serinus citrinella</i>
Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>
Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>
Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i>
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>

Poisson

Barbeau méridional	<i>Barbus meridionalis</i>
--------------------	----------------------------

Faune invertébrée

Coléoptère

Barbot ou Pique-prune	<i>Osmoderma eremita</i>
-----------------------	--------------------------

Crustacé

Ecrevisse à pattes blanches	<i>Austropotamobius pallipes</i>
-----------------------------	----------------------------------

Papillon

Apollon	<i>Parnassius apollo</i>
Semi Apollon	<i>Parnassius mnemosyne</i>
Proserpine	<i>Zerynthia rumina</i>

Bibliographie

GARRAUD, L.

Espace Naturel Sensible. Montagne de Praloubeau

1996 pages : 56 p. Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

Espace Naturel Sensible. Sommet de la Plaine. Site de Rimon et Savel

1996 pages : Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique

2003 pages : 925 p Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

GRIMAL, X.

Directive Habitats Natura 2000. La forêt de la Luine (26)

1998 pages : 5 p. Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin


TESSIER C.

Projet de réintroduction du vautour fauve dans le Diois

1992 pages : 27 p. Consultable : Parc Naturel Régional du Vercors




Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF II* N°2613



* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Légende

-  Périmètre de la ZNIEFF type 2
-  Autres ZNIEFF type 2
-  ZNIEFF type 1

