Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : **26130003**

Ancien N° régional : 26145303,26145301,26145302

Montagnes d'Aucelon, de Boutarinard et de l'Eyriau

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 5 427,38 ha

Drôme ARNAYON, VOLVENT

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	0
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	1

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **174**

Description et intérêt du site

Entre Diois et Baronnies se trouve la Motte-Chalançon. Au nord, la montagne d'Aucelon la domine. Formée de calcaire tithonique (faciès géologique du Jurassique supérieur), elle se prolonge au nord par les montagnes de Boutarinarde, de Praloubeau et de l'Eyrlau. La longue crête voisinant avec les 1200 m d'altitude ainsi formée est couverte de pelouses. Ces pelouses d'altitude abritent la Pulsatille de Haller remarquable par sa forte pilosité argentée et sa fleur de couleur violette. Dans les vallons sous-jacents des pelouses sèches s'y distinguent. De fortes pentes, boisées et rocheuses, constituent le terrain de prédilection pour cet excellent grimpeur qu'est le Chamois. Dans les gouffres, formés suite à la dissolution de la roche calcaire par l'eau, gîte le Petit Rhinolophe. Au repos et en hibernation, il s'enveloppe complètement dans ses ailes. Les falaises du site permettent la nidification de l'Aigle royal. Au printemps, il est fréquent d'observer ses parades territoriales. Il dessine alors de larges festons en longeant les crêtes de son domaine. La présence des Bruants fou, ortolan et proyer indique des milieux biens exposés, chauds et ouverts. La Pie-grièche écorcheur affectionne, elle aussi, les espaces ouverts parsemés de buissons et fourrés. D'un perchoir dégagé, elle s'envole pour capturer des proies au sol, des insectes surtout. Elle les empale, ensuite, sur les épines des arbustes environnants qui lui servent de garde-manger ou "lardoir". Cet oiseau migrateur n'est présent dans nos contrées que de mai à septembre. Le Bec-croisé des sapins, quant à lui, est granivore. Ce passereau, au plumage rouge ou verdâtre selon le sexe, se nourrit exclusivement de graines de résineux qu'il extrait du cône grâce à son bec particulier. Dés le crépuscule, d'autres oiseaux apparaissent. C'est le cas de l'Engoulevent d'Europe ou encore du Grand-duc d'Europe. Plus grand rapace nocturne d'Europe, avec une envergure de 1,6 m à 1,9 m, se tient caché dans les rochers pendant le jour et passe ainsi inaperçu grâce à son plumage de couleur fauve. En lisière de forêt, la Pivoine officinale offre sa corolle au rose soutenu. Recherchée autrefois pour ses vertus médicinales, cette belle plante est actuellement protégée.

Milieux naturels

34.32	PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES

Flore

Aconit tue-loup	*Aconitum lycoctonum subsp. vulparia (Reichenb. ex Sprengel) Nyman*
Alysson champêtre	*Alyssum simplex Rudolphi in Schrader*
Arabette nouvelle	*Arabis nova Vill.*
Doradille des sources	*Asplenium fontanum (L.) Bernh.*
Astragale blanchâtre	*Astragalus incanus L.*
Lunetière à feuilles de chicorée	*Biscutella cichoriifolia Loisel.*
Campanule des Alpes	*Campanula alpestris All.*
Centaurée de Trionfetti var.	*Centaurea triumfetti subsp. semidecurrens*
Centaurée de Trionfetti var.	*Centaurea triumfetti subsp. triumfetti*
Cirse de Montpellier	*Cirsium monspessulanum*
Crocus bigarré (Crocus de Crest)	*Crocus versicolor Ker-Gawler*
Croisette du Piémont	*Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend.*
Crupine commune	*Crupina vulgaris Cass.*
Cytise de Sauze	*Cytisus sauzeanus Burnat & Briq.*
Daphné camélé	*Daphne cneorum L*
Œillet de Grenoble	*Dianthus gratianopolitanus Vill.*
Echinops à têtes rondes	*Echinops sphaerocephalus L.*
Fritillaire du Dauphiné	*Fritillaria tubiformis Gren. & Godron*
Gaillet grêle	*Galium spurium subsp. tenerum (Schleich. ex Gaudin) Kerguélen*
Genêt de Villars	*Genista pulchella subsp. villarsii (G.C. Clementi) Kerguélen*
Orchis odorant	*Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard*
Avoine soyeuse	*Helictotrichon setaceum (Vill.) Henrard*
Epervière tomenteuse	*Hieracium tomentosum L. [1755]*
Millepertuis à feuilles d'Hysope	*Hypericum hyssopifolium Chaix*
Ibéris des rochers	*Iberis saxatilis L.*
Genévrier de Phénicie	*Juniperus phoenicea L.*
Genévrier sabine	*Juniperus sabina L.*
Genévrier thurifère	*Juniperus thurifera L.*
Laitue vireuse	*Lactuca virosa L.*
Gesse blanchâtre	*Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides (Gouan) Bässler*
Bugrane striée	*Ononis striata Gouan*
Orchis de Provence	*Orchis provincialis Balbis ex DC.*
Pivoine officinale	*Paeonia officinalis L.*
Pivoine velue	*Paeonia officinalis subsp. huthii Soldano [1993]*
Raiponce de charmeil	*Phyteuma charmelii Vill.*
Plantain argenté	*Plantago argentea Chaix*
Pulsatille de Haller	*Pulsatilla halleri (All.) Willd.*
Renoncule de Montpellier	*Ranunculus monspeliacus L.*
Saxifrage silonnée	*Saxifraga exarata subsp. delphinensis (Ravaud) Kerguélen*
Joubarbe des terrains calcaires	*Sempervivum calcareum Jordan*
Séneçon doria	*Senecio doria L.*
Silène des forêts	*Silene nemoralis Waldst. & Kit.*
Grande Tordyle	*Tordylium maximum L.*
Tulipe méridionale	*Tulipa australis Link*
Valérianelle dentée	*Valerianella dentata (L.) Pollich*
Véronique précoce	*Veronica praecox All.*

Faune vertébrée

Amphibiens	
Sonneur à ventre jaune	*Bombina variegata*
Mammifères	
Lièvre d'Europe	*Lepus europaeus*
Petit rhinolophe	*Rhinolophus hipposideros*
Chamois	*Rupicapra rupicapra*
Oiseaux	
Alouette des champs	*Alauda arvensis*
Pipit rousseline	*Anthus campestris*
Pipit spioncelle	*Anthus spinoletta*
Aigle royal	*Aquila chrysaetos*
Grand-duc d'Europe	*Bubo bubo*
Engoulevent d'Europe	*Caprimulgus europaeus*
Caille des blés	*Coturnix coturnix*
Pic épeichette	*Dendrocopos minor*
Bruant fou	*Emberiza cia*
Bruant ortolan	*Emberiza hortulana*
Faucon pèlerin	*Falco peregrinus*
Pie-grièche écorcheur	*Lanius collurio*
Bec-croisé des sapins	*Loxia curvirostra*
Alouette lulu	*Lullula arborea*
Bruant proyer	*Miliaria calandra*
Merle de roche	*Monticola saxatilis*
Traquet motteux	*Oenanthe oenanthe*
Moineau soulcie	*Petronia petronia*
Venturon montagnard	*Serinus citrinella*
Fauvette orphée	*Sylvia hortensis*
Fauvette pitchou	*Sylvia undata*
Tétras lyre	*Tetrao tetrix*
Huppe fasciée	*Upupa epops*

Faune invertébrée

Papillons	
Apollon	*Parnassius apollo*
Semi Apollon	*Parnassius mnemosyne*

Bibliographie

BARBARO L., BOYER P.

Observations sur la nidification et l'évolution récente du Moineau soulcie (Petronia petronia L.) dans les Préalpes du sud (Drôme, Isère et Alpes de Haute-provence)

p 2 pages 1999 Consultable : CORA Région

BRAUD Y., SCHLEICHER J.

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

13 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

BROYER J.

Evaluation de l'incidence des mesures agri-environnementales sur l'avifaune prairiale dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002)

15 pages 2002 Consultable : ONCFS

CORA

Atlas des Chiroptères de Rhône-Alpes, hors série n°2

134 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CORA Drôme

Oiseaux de la Drôme

312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GARRAUD L.

Espace Naturel Sensible. Montagne de Praloubeau

56 pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

GRIMAL X.

Directive Habitats Natura 2000. La forêt de la Luine (26)

4-1 pages 1998 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

JACOB L.

Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté

16 pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

MORAND A.

Une espèce vulnérable : le sonneur à ventre jaune

p 3 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

TAKORIAN L.

Bombina variegata : inventaire des populations, effectifs, mesures conservatoires - site de l'Etournel

22 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

TYSSANDIER P.

La Fauvette orphée (Sylvia hortensis) en France

p 1 pages 1991 Consultable : CORA Région

VINCENT S.

Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grottes à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire

16 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

VINCENT S., ISSARTEL G.

Inventaire des gîtes cavernicoles d'intérêt majeur pour les chiroptères en région Rhône-Alpes

42 pages 2005 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°26130003

Carte d'Assemblage





Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°26130003

26130004

26130002

26090007

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Feuille 1/3

Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°26130003

26130003

26130001

26000047

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Feuille 2/3

N

Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°26130003

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Feuille 3/3

N

Echelle : 1 / 25 000

fonds IGN Scan 25 (C)