



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 26130005

Ancien N° régional : 26155301,26155303,26165302

Massif de Justin, Solaure, Serre Chauvière et montagne de Rimon-et-Savel

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 2 656,45 ha

Drôme

AIX-EN-DIOIS, AUREL, BARNAVE, BARSAC, DIE, MONTMAUR-EN-DIOIS, PENNES-LE-SEC, RIMON-ET-SAVEL

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
Végétaux supérieurs	2	Mammifères	0	Crustacés	2	Libellules	0
Mousses, lichens	0	Oiseaux	3	Mollusques	0	Orthoptères	0
		Poissons	0			Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 43

Description et intérêt du site

Cet ensemble de crêtes et de forêts montagneuses est situé au sud de Die, et prolonge, au nord du col de Pennes, les crêtes montagneuses d'Aucelon. La zone peut être délimitée en trois entités continues, reliées chacune par des cols. Au nord de cet ensemble, le massif de Justin domine la ville de Die. De bons sentiers balisés au départ de Die permettent de grimper les fortes pentes boisées pour atteindre la croix de Justin, puis le Petit ou le Grand Justin. L'altitude maximale dépasse 1000 m. Le col de Beaufayn permet de faire la liaison entre le massif de Justin et celui de Solaure juste au sud. Les pentes reboisées en Pin noir d'Autriche s'élèvent au-dessus d'Aurel. A proximité de la crête de Serre Chauvière, la forêt laisse place à des pelouses maigres et rocailleuses où se développent les touffes de Lavande vraie et de Thym vulgaire d'altitude, si parfumées. Le point culminant de cette crête offre à 1262 m d'altitude un panorama superbe sur la haute vallée de la Drôme et le Glandasse. Au sud du col de Royet, auquel on peut accéder par une piste carrossable depuis Montmaur-en-Diois, les crêtes de Solaure se prolongent par celles de Rimon-et-Savel jusqu'au col de Pennes. Ce bel ensemble se caractérise par son avifaune liée aux milieux montagnards (Aigle royal, Bec-croisé des sapins, Tétraz lyre, Traquet motteux, Venturon montagnard...), ainsi qu'aux landes et pelouses sèches (Engoulevent d'Europe, Huppe fasciée, Bruant ortolan, Pie-grièche écorcheur, Torcol fourmilier, Fauvette des jardins, Fauvette passerinette...). La flore abrite ici quelques espèces remarquables. Le Genévrier thurifère, qui aurait résisté aux glaciations quaternaires, est présent en France sur une aire géographique bien délimitée incluant principalement les montagnes méridionales de la Drôme et des Hautes-Alpes. Le Cotonéaster du Dauphiné est un arbuste méconnu, redécouvert il y a quelques années seulement et inscrit au "livre rouge" de la flore menacée en France. C'est une espèce des montagnes ouest-méditerranéennes dont la répartition reste à étudier. Il est présent ponctuellement dans les Baronnies, le Diois et jusque dans le Gapençais. L'Orobanche de la sauge est une plante qui parasite différentes sauges (Sauge glutineuse ou Sauge des prés). Cette espèce rare, également inscrite au "livre rouge", n'a été signalée pour l'instant qu'ici dans la Drôme. Les pelouses et milieux rocailleux secs favorisent un ensemble de plantes, dont les plus remarquables sont le Micropus dressé, la Bufonie paniculée, le Liseron Cantabrique, le Millepertuis à feuilles d'Hysope, l'Ibérus penné, le Bugrane strié, la Renoncule à feuilles de graminées, et la Stipe pennée (ou "Cheveux d'ange") dont on voit les plumets s'agiter au vent.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Flore

Asperge à feuilles étroites	<i>Asparagus tenuifolius</i> Lam.
Doradille des sources	<i>Asplenium fontanum</i> (L.) Bernh.
Micropus dressé	<i>Bombycilaena erecta</i>
Cirse de Montpellier	<i>Cirsium monspessulanum</i>
Cotonéaster du Dauphiné	<i>Cotoneaster delphinensis</i> Chatenier
Crupine commune	<i>Crupina vulgaris</i> Cass.
Fusain à larges feuilles	<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Miller
Fraisier vert	<i>Fragaria viridis</i> Weston
Gaïlet grêle	<i>Galium spurium</i> subsp. <i>tenerum</i> (Schleich. ex Gaudin) Kerguelen
Millepertuis à feuilles d'Hysopé	<i>Hypericum hyssopifolium</i> Chaix
Ibéris penné	<i>Iberis pinnata</i> L.
Iris nain	<i>Iris lutescens</i> Lam.
Genévrier de Phénicie	<i>Juniperus phoenicea</i> L.
Genévrier thurifère	<i>Juniperus thurifera</i> L.
Gesse blanchâtre	<i>Lathyrus pannonicus</i> subsp. <i>asphodeloides</i> (Gouan) Bässler
Bugrane striée	<i>Ononis striata</i> Gouan
Joubarbe des terrains calcaires	<i>Sempervivum calcareum</i> Jordan
Grande Tordyle	<i>Tordylium maximum</i> L.
Tulipe méridionale	<i>Tulipa australis</i> Link
Violette admirable	<i>Viola mirabilis</i> L.

Faune vertébrée

Mammifères

Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>
---------	----------------------------

Oiseaux

Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Pie-grèche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Bruant proyer	<i>Miliaria calandra</i>
Merle de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Cassenois moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>
Venturon montagnard	<i>Serinus citrinella</i>
Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>

Faune invertébrée

Crustacés

Ecrevisse à pattes blanches	<i>Austropotamobius pallipes</i>
-----------------------------	----------------------------------

Bibliographie

- BALIAN C.**
Inventaire et étude sur l'écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes)
42 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes
- BARBARO L., BOYER P.**
Observations sur la nidification et l'évolution récente du Moineau soulcie (Petronia petronia L.) dans les Préalpes du sud (Drôme, Isère et Alpes de Haute-provence)
p 2 pages 1999 Consultable : CORA Région
- Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture**
Les écrevisses européennes autochtones en relation avec l'occupation des sols et la détérioration de l'habitat, plus spécialement Austropotamobius torrentium : CRAYNET meeting, Innsbruck, Autriche, 8-11 septembre 2004 (volume 3)
pages 2004 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes
- CORA**
Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes
335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CORA Drôme*Oiseaux de la Drôme*

312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

FAURE J.P.*Suivi des populations d'écrevisses à pieds blancs dans le PNR du Pilat*

19 pages 2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

FROMENT B., PETIT-MARTENON V.*Etat des populations d'écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) - Ravins rhodaniens du Parc Naturel régional du Pilat*

41 pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GARRAUD L.*Espace Naturel Sensible. Sommet de la Plaine. Site de Rimon et Savel*

pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

GRES P.*Actualisation des données sur les sites à écrevisses à pieds blancs du Parc Naturel Régional du Pilat (Loire)*


19 pages 2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GROSSI J.-L.*Haut-Rhône - Chautagne - Lavours - Bourget - Document d'objectifs - volume annexe*

III. pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes


VIERON J.P., FATON J.M.*Etude des écrevisses dans les zones éligibles de la directive "Habitats" du département de la Drôme*

8 p. pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°26130005


Carte d'Assemblage



Légende




Périmètre de la ZNIEFF type 1



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy