

HAUT DIOIS : HAUT BASSIN DE LA DROME

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 8 804 ha

Drôme

LA BATIE-DES-FONDS, BEAURIERES, CHARENS, LES PRES, SAINT-DIZIER-EN-DIOIS, VALDROME,

ZNIEFF de type I concernées par cette zone

26140001,26140002,26140003,26140004,26140005

Description et intérêt du site

Dès le passage du col du Rousset, les traits déjà méridionaux du Diois offrent un contraste saisissant avec le climat montagnard du Vercors central. Silloné par la Drôme et dominé par l'imposant massif du Glandasse, le Diois peut être considéré comme l'une des portes de la Provence. La lavande y est, avec la vigne, l'une des cultures traditionnelles.

Le haut-bassin de la Drôme appartient au Haut-Diois. Ici, les formations végétales méditerranéennes restent bien présentes à faible altitude et en situation bien exposée, mais elles sont plus haut vite relayées par un étage montagnard dominé par la hêtraie ou la hêtraie-sapinière, voire subalpin à partir de 1700 m d'altitude, avec des formations à Pin à crochets.

Il présente un grand intérêt botanique (marqué par des stations de plantes particulièrement rares, telles que la Pivoine officinale, de plantes endémiques des Alpes dauphinoises : Cytise de Sauze, Androsace de Chaix, Fritillaire du Dauphiné, ou d'espèces montagnardes peu répandues comme le Trochiscanthe nodiflore...). C'est également vrai pour la faune (s'agissant notamment des insectes et des oiseaux, par exemple en ce qui concerne les oiseaux rupicoles). Des grottes et quelques zones humides sont également dignes d'intérêt.

Le secteur abrite en outre un karst caractéristique des Préalpes du sud. Ce type de karst est caractérisé par sa discontinuité, du fait des mouvements tectoniques, des variations de faciès et de l'érosion intervenue durant la période miocène.

Le peuplement faunistique du karst du Diois est relativement bien connu. certaines espèces (par exemple un coléoptère tréchiné) sont des endémiques dont la répartition est circonscrite au Vercors et au Diois.

Le zonage de type II souligne l'unité de cet ensemble naturel au sein duquel les secteurs abritant les habitats ou les espèces les plus remarquables sont retranscrits par zones de type I (principaux massifs, gorges ou vallons comportant des ensembles cohérents de zones humides). En dehors de celles-ci, d'autres secteurs peuvent s'avérer remarquables, par exemple pour l'entomofaune (cas des stations de papillons Azuré du serpolet et Damier de la Succise connues du domaine skiable de Valdrôme...).

Il illustre également les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales (dont celles précédemment citées), en tant que zone d'alimentation ou de reproduction pour plusieurs espèces remarquables (dont certaines exigeant par ailleurs de vastes territoires vitaux, telles que l'Aigle royal ou le Vautour fauve), notamment parmi les oiseaux (des Chouette de Tengmalm, Merle à plastron, Venturon montagnard ou Tétrasyre des sommets jusqu'aux Alouette lulu ou bruants méridionaux...).

Il souligne enfin la présence probable d'habitats ou d'espèces remarquables (notamment parmi les autres groupes faunistiques) en dehors des seules zones de type I, qui mériterait d'être confirmée à l'occasion d'inventaires complémentaires.

En ce qui concerne les secteurs karstiques, la sur-fréquentation des grottes, le vandalisme des concrétions peuvent de plus rendre le milieu inapte à la vie des espèces souterraines. Les aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions accidentelles ou découlant de l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture intensive.

L'ensemble présente par ailleurs un grand intérêt paysager et biogéographique, compte-tenu de la présence de nombreuses espèces végétales ou animales parvenant ici en limite d'aire de répartition, aux confins des domaines alpin et méditerranéen.

Milieux naturels

24.223	BROUSSAILLES DE SAULES ET DE MYRICAIRE GERMANIQUE
24.224	FOURRES ET BOIS DES BANCS DE GRAVIERS
34.32	PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
37.31	PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
41.13	HETRAIES NEUTROPHILES
41.16	HETRAIES SUR CALCAIRE
41.4	FORETS MIXTES DE RAVINS ET DE PENTES
54.12	SOURCES D'EAU DURE
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS
62.3	DALLES ROCHEUSES
65	GROTTES

Flore

Aconit tue-loup	Aconitum lycoctonum subsp. vulparia (Reichenb. ex Sprengel) Nyman
Ail jaune	Allium flavum L.
Ail rocambole (Rocambole)	Allium scorodoprasum subsp. scorodoprasum
Ail des ours	Allium ursinum L.
Androsace de Chaix	Androsace chaixii Gren. & Godron
Arabette nouvelle	Arabis nova Vill.
Aspérule de Turin	Asperula taurina L.
Doradille des sources	Asplenium fontanum (L.) Bernh.
Scirpe maritime	Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
Buplèvre des rochers	Bupleurum petraeum L.
Cirse de Montpellier	Cirsium monspessulanum
Cotonéaster intermédiaire	Cotoneaster x-intermedius (Lecoq & Lamotte) Coste
Crocus bigarré (Crocus de Crest)	Crocus versicolor Ker-Gawler
Sabot de Vénus	Cypripedium calceolus L.
Cytise de Sauze	Cytisus sauzeanus Burnat & Briq.
Daphné camélé	Daphne cneorum L
Fritillaire du Dauphiné	Fritillaria tubiformis Gren. & Godron
Gagée jaune	Gagea lutea (L.) Ker-Gawler
Orchis odorant	Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard
Avoine toujours verte	Helictotrichon sempervirens (Vill.) Pilger
Avoine soyeuse	Helictotrichon setaceum (Vill.) Henrard
Millepertuis à feuilles d'Hysope	Hypericum hyssopifolium Chaix
Inule à feuilles de spirée	Inula spiraeifolia L.
Genévrier sabine	Juniperus sabina L.
Genévrier thurifère	Juniperus thurifera L.
Gesse noirissante	Lathyrus niger (L.) Bernh.
Gesse de Nissolle	Lathyrus nissolia L.
Gesse blanchâtre	Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides (Gouan) Bässler
Myosotis à très petites fleurs	Myosotis minutiflora Boiss. & Reut.
Bugrane striée	Ononis striata Gouan
Orchis de Spitzel	Orchis spitzelii Sauter ex Koch
Pivoine officinale	Paeonia officinalis L.
Pivoine velue	Paeonia officinalis subsp. huthii Soldano [1993]
Raiponce de charmeil	Phyteuma charmelii Vill.
Plantain argenté	Plantago argentea Chaix
Platanthère verdâtre	Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb.
Pulsatille de Haller	Pulsatilla halleri (All.) Willd.
Pyrole verdâtre	Pyrola chlorantha Swartz
Saxifrage silonnée	Saxifraga exarata subsp. delphinensis (Ravaud) Kerguélen
Joubarbe des terrains calcaires	Sempervivum calcareum Jordan
Séneçon doria	Senecio doria L.
Serratule à tige nue	Serratula nudicaulis (L.) DC.
Silène des forêts	Silene nemoralis Waldst. & Kit.
Silène à petites fleurs	Silene otites (L.) Wibel
Silène paradoxale	Silene paradoxa L.
Trochiscanthe nodiflore	Trochiscanthes nodiflora
Tulipe méridionale	Tulipa australis Link
	Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp.

Faune vertébrée

Amphibien	
Grenouille rousse	Rana temporaria
Oiseau	
Autour des palombes	Accipiter gentilis
Chouette de Tengmalm	Aegolius funereus
Alouette des champs	Alauda arvensis
Pipit spioncelle	Anthus spinoletta
Aigle royal	Aquila chrysaetos
Chouette chevêche	Athene noctua
Grimpereau des bois	Certhia familiaris
Busard Saint-Martin	Circus cyaneus
Caille des blés	Coturnix coturnix
Hirondelle de fenêtre	Delichon urbica
Bruant fou	Emberiza cia
Bruant ortolan	Emberiza hortulana
Faucon pèlerin	Falco peregrinus
Pie-grièche écorcheur	Lanius collurio
Alouette lulu	Lullula arborea
Bruant proyer	Miliaria calandra
Merle de roche	Monticola saxatilis
Traquet motteux	Oenanthe oenanthe
Bécasse des bois	Scolopax rusticola
Venturon montagnard	Serinus citrinella
Tétras lyre	Tetrao tetrix
Tichodrome échelette	Tichodroma muraria
Merle à plastron	Turdus torquatus

Faune invertébrée

Papillon	
Hermite	Chazara briseis
Azuré du serpolet	Maculinea arion
Azuré de la Croisette	Maculinea rebeli
Azuré de la sanguisorbe	Maculinea teleius
Apollon	Parnassius apollo

Valérianelle à fruits velus	<i>Valerianella eriocarpa</i> Desv.
Véronique précoce	<i>Veronica praecox</i> All.
Véronique du printemps	<i>Veronica verna</i> L.
Violette admirable	<i>Viola mirabilis</i> L.

Bibliographie

DIDIER G., Parc Naturel Régional du Vercors

La gestion d'un espace naturel : Le Parc Naturel Régional du Vercors

1999 pages : Consultable : Parc Naturel Régional du Vercors

GARRAUD,L.

Espace Naturel Sensible. Montagne de l'Aup. Site de Valdrôme

1996 pages : 37 p. Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique

2003 pages : 925 p Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

Parc Naturel Régional du Vercors


Le rôle multifonctionnel de la forêt du Parc naturel régional du Vercors : Cartographie et enjeux

1996 pages : 126 p Consultable : Parc Naturel Régional du Vercors


RASPAIL,C.

Directive Habitats. Natura 2000. Montagne de l'Aup et de la Sarcena. Site D18 "Pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux de la Montagne de l'Aup et de la Sarcena" (commune de Valdrome, Drôme)

1998 pages : 89 p. Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin



Légende

-  Périmètre de la ZNIEFF type 2
-  Autres ZNIEFF type 2
-  ZNIEFF type 1

