



ZNIEFF* de type I

N° régional : 26140002

Ancien N° régional : 26335402

Hautes gorges de la Drôme et montagne de l'Archier

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1 070,71 ha

Drôme BEAURIERES, LES PRES

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux sucoérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 22

Description et intérêt du site

Cette zone comprend les deux versants de la montagne de l'Archier, que l'on longe en montant au col de Cabre, et se poursuit en versant sud sur la commune des Prés pour inclure les gorges de la Drôme, jusqu'aux pentes de la montagne de Tarsimoure. Les milieux forestiers, composé principalement de Pin noir d'Autriche et de Hêtre, dominent ces montagnes. Les crêtes laissent place à des milieux plus ouverts de pelouses, landes ou prés bois. Le Trochiscanthe nodiflore est une grande plante forestière, de la famille des ombellifères, qui caractérise certains types de hêtraies des Alpes. Cette espèce parvient ici en limite occidentale de son aire de répartition géographique. L'Androsace de Chaix, endémique des Alpes provençales, se rencontre dans des hêtraies sèches. Quatre espèces remarquables de rapaces fréquentent les lieux, chacun caractérisant des conditions différentes d'habitat : - le Circaète Jean-le-Blanc, petit aigle chasseur de reptiles, survole les landes ouvertes et construit son nid sur un arbre ; - le Faucon pèlerin choisit une falaise assez haute et chasse en plein vol ; - l'Aigle royal installe son aire dans une falaise et chasse sur des milieux ouverts ; - le Busard Saint-Martin préfère nicher à même le sol, dans des landes ou pelouses montagnardes. Le Tétraz lyre, espèce emblématique, semble encore présent sur ces montagnes de manière très rélictuelle. Le Grand Sylvain est un papillon aux ailes brun-noir et tachées de blanc et de fauve sur le dessus, et orangé sur le dessous. La chenille se développe sur les feuilles des Trembles. Il vient s'alimenter sur les excréments le long des chemins humides ensoleillés. Ce papillon est actuellement en régression.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>

Flore

Aconit tue-loup	<i>Aconitum lycoctonum subsp. vulparia (Reichenb. ex Sprengel) Nyman</i>
Ail jaune	<i>Allium flavum L.</i>
Androsace de Chaix	<i>Androsace chaixii Gren. & Godron</i>
Doradille des sources	<i>Asplenium fontanum (L.) Bernh.</i>
Sabot de Vénus	<i>Cypripedium calceolus L.</i>
Orchis odorant	<i>Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard</i>
Millepertuis à feuilles d'Hysope	<i>Hypericum hyssopifolium Chaix</i>
Inule à feuilles de spirée	<i>Inula spiraeifolia L.</i>
Gesse noirissante	<i>Lathyrus niger (L.) Bernh.</i>
Orchis de Spitzel	<i>Orchis spitzelii Sauter ex Koch</i>
Platanthère verdâtre	<i>Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb.</i>
Trochiscanthe nodiflore	<i>Trochiscanthes nodiflora</i>
Violette admirable	<i>Viola mirabilis L.</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

BROYER J.

Evaluation de l'incidence des mesures agri-environnementales sur l'avifaune prairiale dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002)

15 pages 2002 Consultable : ONCFS

GARRAUD L.

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

