



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 26140003

Ancien N° régional : 26335401

Vallon de Carabès

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 282,46 ha

Drôme

LA BATIE-DES-FONDS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	2
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 33

Description et intérêt du site

Lorsque l'on remonte la vallée de la Drôme, on atteint, en suivant une petite route après Valdrôme, le petit village de La Bâtie-des-Fonds. Après le village, une piste carrossable grimpe, et franchit, à 1261 m d'altitude, le col de Carabès, en limite avec le département des Hautes-Alpes. Le vallon de Carabès est entouré, de part et d'autre, de montagnes boisées principalement de pins. Entre le village et le col, un ensemble original de mares, couvertes de massettes ou de roseaux, laisse échapper des ruisselets marécageux dans le fond du vallon. Dans la combe, de nombreuses petites sources se regroupent et forment, au niveau du village, un petit ruisseau qui deviendra la Drôme. Le vallon de Carabès est couvert d'une mosaïque de milieux imbriqués les uns dans les autres : bois de Pin sylvestre, pelouses fleuries, mares et marécages. La flore reflète cette richesse avec la présence d'orchidées forestières (Orchis de Spitzel, Orchis pâle, Sabot de Vénus...), d'espèces des marais (Orchis, Parnassie des marais, Cirse de Montpellier...) ou des milieux plus secs (Gymnadénie très odorante, épipactis à feuilles distantes...). Le Cytise de Sauze est un petit arbuste, à fleurs jaunes, qui pousse sur les pentes rocailleuses ; il se cantonne à un territoire restreint des montagnes du Dauphiné (Drôme et Hautes-Alpes), avec un centre de gravité dans le Bochaîne et le Serrois (Hautes-Alpes). Cette espèce endémique (c'est à dire dont l'aire de répartition est limitée à une zone géographique restreinte) propre aux Alpes dauphinoises est inscrite au "livre rouge" de la flore menacée de France. L'exploitation forestière, le piétinement, la concurrence végétale et, également, le parasitisme des feuilles et des fruits, sont les principales menaces qui pèsent sur cette arbrisseau. D'un point de vue paysager, le vallon de Carabès est un site montagnard très agréable et calme. Le marais du Col de Carabès, en particulier, est un site magnifique. Des milieux secs et humides se juxtaposent contribuant à la forte diversité paysagère. Les milieux humides, alimentés par différentes sources d'eau dure, sont constitués par des "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) à Laîche de Daval et des communautés végétales à Scirpe des forêts. Différentes zones d'eau libre sont également présentes ainsi que des bosquets de Saules pourpres.

Milieus naturels

24.223	BROUSSAILLES DE SAULES ET DE MYRICAIRE GERMANIQUE
24.224	FOURRES ET BOIS DES BANCS DE GRAVIERS
34.32	PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
54.12	SOURCES D'EAU DURE
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS

Flore

Androsace de Chaix	<i>Androsace chaixii</i> Gren. & Godron
Arabette nouvelle	<i>Arabis nova</i> Vill.
Scirpe maritime	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla
Cirse de Montpellier	<i>Cirsium monspessulanum</i>
Cotonéaster intermédiaire	<i>Cotoneaster x-intermedius</i> (Lecoq & Lamotte) Coste
Sabot de Vénus	<i>Cypripedium calceolus</i> L.
Cytise de Sauze	<i>Cytisus sauzeanus</i> Burnat & Briq.
Orchis odorant	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L.C.M. Richard
Millepertuis à feuilles d'Hysope	<i>Hypericum hyssopifolium</i> Chaix
Gesse blanchâtre	<i>Lathyrus pannonicus</i> subsp. <i>asphodeloides</i> (Gouan) Bässler
Orchis de Spitzel	<i>Orchis spitzelii</i> Sauter ex Koch
Platanthère verdâtre	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Reichenb.
Séneçon doria	<i>Senecio doria</i> L.
Silène des forêts	<i>Silene nemoralis</i> Waldst. & Kit.
Trochiscanthe nodiflore	<i>Trochiscanthes nodiflora</i>
Violette admirable	<i>Viola mirabilis</i> L.

Faune vertébrée

Amphibiens	
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Oiseaux	
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>

Faune invertébrée

Papillons	
Hermite	<i>Chazara briseis</i>
Azuré du serpolet	<i>Maculinea arion</i>
Azuré de la Croisette	<i>Maculinea rebeli</i>
Azuré de la sanguisorbe	<i>Maculinea teleius</i>

Bibliographie

BETTINELLI L., MORA F.

Plan d'action en faveur de l'Azuré de la Croisette (Maculinea rebeli) en Franche-Comté

18 pages 2004 Consultable : Pôle Relais Tourbières

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 -

15 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

CRAPLET L.

Suivi de population de Maculinea alcon rebeli (Azuré de la Croisette) (Lepidoptera, Rhopalocera)

23 pages 1997 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

GARRAUD L.

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

ROZIER Y.

Suivi Maculinea - Marais des Bidonnes - été 1997

13 pages 1997 Consultable : DIREN Rhône-Alpes




MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
ET DU TERRITOIRE
DURABLE



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°26140003

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)