



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 26170002

Ancien N° régional : 26395901

Devès et montagne des Vaux

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 156,87 ha

Drôme

AUBRES, NYONS, VENTEROL

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens		Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 29

Description et intérêt du site

La ville de Nyons s'est établie sur les bords de l'Aygue, et ses dernières maisons remontent la colline jusqu'au pied de la montagne de Vaux. Le Devès prolonge la montagne de Vaux et descend sur Nyons, et l'Aygue, qu'il resserre par un verrou rocheux. Les pentes de ces montagnes, exposées à peu près plein sud, sont couvertes d'une végétation typiquement méditerranéenne : garrigues rocheuses et odorantes à Thym vulgaire, Genévrier oxycède (ou Cade) et Genêt scorpion ; boisements de Pin d'Alep et de Chêne vert ; escarpements rocheux couverts de Chêne vert et de Genévrier de Phénicie. Un sentier balisé GR permet de monter au Devès depuis Nyons, puis de faire le tour de la montagne de Vaux. Au détour du chemin, il est possible d'observer une grande orchidée aux fleurs teintées de rouge, l'Orchis à longue bractée. Elle fleurit dès la fin du mois de mars. On la trouve dans la garrigue en compagnie de l'Orobanche blanche. Comme toutes les espèces de cette famille, celle-ci parasite une autre plante. Souvent même ce parasitisme est strict, ce qui peut constituer un moyen de les différencier entre elles. C'est le cas de l'Orobanche blanche qui se trouve exclusivement sur le thym. La Fauvette mélanocéphale et la Fauvette pitchou, plus rare, font entendre leurs cris grinçants dans les fourrés denses.

Milieux naturels

31.8123	FRUCTICEES DE STATIONS ROCAILLEUSES A COTONEASTER ET AMELANCHIER
34.33	PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES
34.5	PELOUSES XEROPHILES MEDITERRANEENNES

Faune vertébrée

Oiseaux	
Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i>

Flore

Capillaire de Montpellier	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.
Ail jaune	<i>Allium flavum</i> L.
Doradille des sources	<i>Asplenium fontanum</i> (L.) Bernh.
Orchis à longues bractées	<i>Barlia robertiana</i> (Loisel.) Greuter
Micropus dressé	<i>Bombycilaena erecta</i>
Cléistogénès tardif	<i>Cleistogenes serotina</i> (L.) Keng
Crupine commune	<i>Crupina vulgaris</i> Cass.
Fumana à feuilles de Thym	<i>Fumana thymifolia</i> (L.) Spach ex Webb
Globulaire allongée	<i>Globularia vulgaris</i> L.
Iris nain	<i>Iris lutescens</i> Lam.
Jasmin buissonnant	<i>Jasminum fruticans</i> L.
Genévrier de Phénicie	<i>Juniperus phoenicea</i> L.
Lentille sauvage	<i>Lens nigricans</i> (M. Bieb.) Godron
Mélique pyramidale	<i>Melica minuta</i> L.
Mélilot de Naples	<i>Melilotus neapolitanus</i> Ten.
Orobanche blanche	<i>Orobanche alba</i> Willd.
Stipe d'Offner	<i>Stipa offneri</i> Breistr.


Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

GARRAUD L.
Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique
925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°26170002



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)