

CHAINONS SEPTENTRIONAUX DES BARONNIES

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 23 207 ha

Drôme

ARNAYON, ARPAVON, BELLECOMBE-TARENDOL, BOUVIERES, LA CHARCE, CHAUDEBONNE, CONDORCET, CORNILLAC, CORNILLON-SUR-L'OULE, CURNIER, EYROLES, GUMIANE, LEMPS, MONTREAL-LES-SOURCES, LA MOTTE-CHALANCON, PELONNE, LES PILLES, LE POET-SIGILLAT, POMMEROL, REMUZAT, ROTTIER, SAHUNE, SAINT-FERREOL-TRENTE-PAS, SAINT-MAY, VERCLAUSE, VILLEPERDRIX,

ZNIEFF de type I concernées par cette zone

26180001,26180002,26180003,26180004,26180005,26180006,26180007,26180008,26180009,26180010,26180011

Description et intérêt du site

Le massif des Baronnies, qui culmine à la Montagne d'Angèle (1606 m), fait partie des Préalpes méridionales. La géologie du secteur est particulièrement complexe, et le relief de prime abord chaotique s'y organise en fait autour de deux axes distincts : l'un nord/sud, dans le prolongement du Vercors, et l'autre est/ouest, à l'image des chaînons provençaux. Les calcaires alternent avec de vastes étendues de marnes noires sujettes au ravinement.

Le paysage présente des traits franchement méditerranéens, qu'il s'agisse de l'habitat, des pratiques culturelles (pastoralisme, vigne, plantes aromatiques, cultures en banquettes d'oliviers...).

La région dans son ensemble présente un grand intérêt naturaliste et paysager.

Cet ensemble naturel en épouse sans solution de continuité les chaînons septentrionaux, aux confins du Diois.

Appartenant au domaine méditerranéen, comme l'illustre la présence déjà notable du Chêne kermès à l'étage « mésoméditerranéen » (bien développé dans la basse vallée de l'Eygues), il comporte également un étage de végétation supra-méditerranéen marqué par le large développement de la chênaie pubescente et de la buxaie. Des hêtraies méridionales reliques subsistent à la faveur de stations fraîches, induites par de fortes oppositions de versants.

Il présente un grand intérêt botanique (avec des « points forts » en ce qui concerne les messicoles -c'est à dire les plantes sauvages associées aux cultures traditionnelles parmi lesquelles la Nielle des blés, la Nigelle de Damas ou la Gagée des prés-, les espèces méditerranéennes en limite de leur aire de répartition telles que l'Œillet rude, l'Anthémis de Trionfetti, la Dauphinelle fendue, les endémiques sud-alpines comme le Cytise de Sauze, l'Androsace de Chaix, la Fritillaire du Dauphiné ou les stations isolées de certaines espèces rares, telles que le Cotoneaster de l'Atlas). Quant au Cotoneaster du Dauphiné, c'est une espèce des montagnes ouest-méditerranéennes dont la répartition demeure mal connue.

Il en est de même en ce qui concerne la faune -notamment les oiseaux, dont les grands rapaces-, au sein de laquelle de nombreuses espèces méditerranéennes sont également présentes (Lézard ocellé chez les reptiles, Magicienne dentelée et papillon Alexanor parmi les insectes, Merle bleu, Hirondelle rousseline et et Moineau soulcie parmi les oiseaux, Molosse de Cestoni chez les chiroptères...).

Elles voisinent avec un cortège conséquent de montagnardes (Gélinotte des bois, Venturon montagnard...). Le Tétralyx parvient ici en limite de son aire de répartition ; ses effectifs subissent néanmoins localement une diminution rapide, probablement imputable à la modification des habitats favorables à l'espèce. Enfin, le secteur abrite enfin un karst caractéristique des Préalpes du sud. Ce type de karst est caractérisé par sa discontinuité, du fait des mouvements tectoniques, des variations de faciès et de l'érosion intervenue durant la période miocène.

Le zonage de type II souligne l'unité de cet ensemble au sein duquel plusieurs secteurs abritant les habitats ou les espèces les plus remarquables sont retranscrits en autant de vastes zones de type I (massifs montagneux, plateaux et gorges) fortement interdépendantes (réseau de pelouses sèches par exemple).

Il illustre également les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales (dont celles précédemment citées), en tant que zone d'alimentation ou de reproduction pour plusieurs espèces remarquables (dont certaines exigeant par ailleurs de vastes territoires vitaux, telles que l'Aigle royal, les Vautours fauve, moine et percnoptère), notamment parmi les oiseaux, les insectes (Pique-prune...) ou les chiroptères.

Il souligne enfin la présence probable d'habitats naturels ou d'espèces remarquables en dehors des seules zones de type I, qui mériterait d'être confirmée à l'occasion d'inventaires complémentaires.

En ce qui concerne les secteurs karstiques, la sur-fréquentation des grottes, le vandalisme des concrétions peuvent de plus rendre le milieu inapte à la vie des espèces souterraines. Les aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions accidentelles ou découlant de l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture intensive.

L'ensemble présente par ailleurs un grand intérêt paysager et biogéographique, compte-tenu de la cohabitation souvent insolite d'animaux ou de plantes appartenant aux domaines montagnard et méditerranéen, et des oppositions climatiques marquées entre versants.

Milieux naturels

24.225	LITS DE GRAVIERS MEDITERRANEENS
32.132	MATORRAL ARBORESCENT A JUNIPERUS MACROCARPA
32.136	MATTORAL ARBORECENT A JUNIPERUS THURIFEA
34.5	PELOUSES XEROPHILES MEDITERRANEENNES
41.175	HETRAIES CALCICOLES SUB MEDITERRANEENNES
44.14	GALERIES MEDITERRANEENNES DE GRANDS SAULES
45.3	FORETS DE CHENES VERTS MESO ET SUPRA MEDITERRANEENNES
54.12	SOURCES D'EAU DURE
65	GROTTES

Flore

Aconit tue-loup	Aconitum lycoctonum subsp. vulparia (Reichenb. ex Sprengel) Nyman
Capillaire de Montpellier	Adiantum capillus-veneris L.
Egilope cylindrique	Aegilops cylindrica Host
Nielle des blés	Agrostemma githago L.
Ail rocambole (Rocambole)	Allium scorodoprasum subsp. scorodoprasum
Ail des ours	Allium ursinum L.
Alysson champêtre	Alyssum simplex Rudolphi in Schrader
Androsace de Chaix	Androsace chaixii Gren. & Godron
Anthémis de Trionfetti	Anthemis triumfetti
Doradille des sources	Asplenium fontanum (L.) Bernh.
Orchis à longues bractées	Barlia robertiana (Loisel.) Greuter
Lunetière à feuilles de chicorée	Biscutella cichoriifolia Loisel.
Micropus dressé	Bombycilaena erecta
Buplèvre des rochers	Bupleurum petraeum L.
Calépine irrégulière	Calepina irregularis (Asso) Thell.
Centaurée de Trionfetti var.	Centaurea triumfetti subsp. semidecurrens
	Chaenorrhinum villosum (L.) Lange
Cirse de Montpellier	Cirsium monspessulanum
Cléistogènes tardif	Cleistogenes serotina (L.) Keng
Cotonéaster de l'Atlas	Cotoneaster atlanticus Klotz
Cotonéaster du Dauphiné	Cotoneaster delphinensis Chatenier
Cotonéaster intermédiaire	Cotoneaster x-intermedius (Lecoq & Lamotte) Coste
Crévide naine	Crepis pygmaea L.
Crocus bigarré (Crocus de Crest)	Crocus versicolor Ker-Gawler
Croisette du Piémont	Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend.
Crupine commune	Crupina vulgaris Cass.
Sabot de Vénus	Cypripedium calceolus L.
Cytise de Sauze	Cytisus sauzeanus Burnat & Briq.
Dauphinelle fendue (Pied d'alouette fendu)	Delphinium fissum Waldst. & Kit.
Œillet de Grenoble	Dianthus gratianopolitanus Vill.
Œillet rude	Dianthus scaber Chaix
Echinops à têtes rondes	Echinops sphaerocephalus L.
Grand éphède	Ephedra major Host [1831]
Epipactis à petites feuilles	Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz
Fusain à larges feuilles	Euonymus latifolius (L.) Miller
Euphorbe à têtes jaune d'or	Euphorbia flavicoma subsp. flavicoma
Euphorbe de Nice	Euphorbia nicaeensis All.
Fétuque	Festuca arundinacea Schreber
Fétuque de Breistoffer	Festuca breistrofferi Chas, Kerguélen & Plonka
Fraisier vert	Fragaria viridis Weston
Fritillaire du Dauphiné	Fritillaria tubiformis Gren. & Godron
Gagée jaune	Gagea lutea (L.) Ker-Gawler
Gagée des prés	Gagea pratensis (Pers.) Dumort.
Gaillat grêle	Galium spurium subsp. tenerum (Schleich. ex Gaudin) Kerguélen
Genêt de Villars	Genista pulchella subsp. villarsii (G.C. Clementi) Kerguélen
Orchis odorant	Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard
Avoine toujours verte	Helictotrichon sempervirens (Vill.) Pilger
Avoine soyeuse	Helictotrichon setaceum (Vill.) Henrard
Julienne laciniée	Hesperis laciniata All.
Epervière tomenteuse	Hieracium tomentosum L. [1755]

Faune vertébrée

Mammifère

Campagnol amphibie	Arvicola sapidus
Castor d'Europe	Castor fiber
Putois	Mustela putorius
Petit murin	Myotis blythi
Noctule commune	Nyctalus noctula
Grand rhinolophe	Rhinolophus ferrumequinum
Petit rhinolophe	Rhinolophus hipposideros
Chamois	Rupicapra rupicapra
Molosse de Cestoni	Tadarida teniotis

Oiseau

Autour des palombes	Accipiter gentilis
Chouette de Tengmalm	Aegolius funereus
Alouette des champs	Alauda arvensis
Martin-pêcheur d'Europe	Alcedo atthis
Pipit rousseline	Anthus campestris
Pipit spioncelle	Anthus spinoletta
Martinet à ventre blanc	Apus melba
Aigle royal	Aquila chrysaetos
Chouette chevêche	Athene noctua
Gélinotte des bois	Bonasa bonasia
Grand-duc d'Europe	Bubo bubo
Engoulevent d'Europe	Caprimulgus europaeus
Grimpereau des bois	Certhia familiaris
Petit Gravelot	Charadrius dubius
Hirondelle de fenêtre	Delichon urbica
Bruant fou	Emberiza cia
Bruant ortolan	Emberiza hortulana
Faucon pèlerin	Falco peregrinus
Faucon hobereau	Falco subbuteo
Vautour fauve	Gyps fulvus
Hirondelle rousseline	Hirundo daurica
Hirondelle de rochers	Hirundo rupestris
Pie-grièche écorcheur	Lanius collurio
Bec-croisé des sapins	Loxia curvirostra
Alouette lulu	Lullula arborea
Bruant proyer	Miliaria calandra
Merle de roche	Monticola saxatilis
Merle bleu	Monticola solitarius
Vautour percnoptère	Neophron percnopterus
Traquet motteux	Oenanthe oenanthe
Hibou Petit-duc	Otus scops
Moineau soulcie	Petronia petronia
Venturon montagnard	Serinus citrinella
Fauvette orphée	Sylvia hortensis
Fauvette pitchou	Sylvia undata
Tétras lyre	Tetrao tetrix
Tichodrome échelette	Tichodroma muraria
Chevalier guignette	Tringa hypoleucos
Grive musicienne	Turdus philomelos
Huppe fasciée	Upupa epops

Reptile

Lézard ocellé	Lacerta lepida
---------------	----------------

Faune invertébrée

Libellule

Agrien de Mercure	Coenagrion mercuriale
Gomphus similaire	Gomphus simillimus

Orthoptère

Magicienne dentelée	Saga pedo
---------------------	-----------

Papillon

Hermite	Chazara briseis
Azuré de la sanguisorbe	Maculinea teleius

Millepertuis à feuilles d'Hysope	<i>Hypericum hyssopifolium</i> Chaix	Alexanor	<i>Papilio alexanor</i>
Ibérís penné	<i>Iberis pinnata</i> L.	Apollon	<i>Parnassius apollo</i>
Inule à feuilles de spirée	<i>Inula spiraeifolia</i> L.	Proserpine	<i>Zerynthia rumina</i>
Iris nain	<i>Iris lutescens</i> Lam.		
Jasmin buissonnant	<i>Jasminum fruticans</i> L.		
Genévrier de Phénicie	<i>Juniperus phoenicea</i> L.		
Genévrier sabine	<i>Juniperus sabina</i> L.		
Genévrier thurifère	<i>Juniperus thurifera</i> L.		
Laitue vireuse	<i>Lactuca virosa</i> L.		
Gesse noirissante	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.		
Lentille sauvage	<i>Lens nigricans</i> (M. Bieb.) Godron		
Grémil ligneux	<i>Lithodora fruticosa</i> (L.) Griseb.		
Mélampyre des champs	<i>Melampyrum arvense</i> L.		
Mélique pyramidale	<i>Melica minuta</i> L.		
Mélilot de Naples	<i>Melilotus neapolitanus</i> Ten.		
Nigelle de Damas	<i>Nigella damascena</i> L.		
Tabouret précoc	<i>Noccaea praecox</i> (Wulfen) F.K. Meyer		
Esparcette des rochers	<i>Onobrychis saxatilis</i> (L.) Lam.		
Bugrane striée	<i>Ononis striata</i> Gouan		
Ophrys de la Drôme	<i>Ophrys drumana</i> Delforge		
Orchis de Provence	<i>Orchis provincialis</i> Balbis ex DC.		
Orchis de Spitzel	<i>Orchis spitzelii</i> Sauter ex Koch		
Pivoine velue	<i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>huthii</i> Soldano [1993]		
Raiponce de charmeil	<i>Phyteuma charmelii</i> Vill.		
Picride à fleurs peu nombreuses	<i>Picris pauciflora</i> Willd.		
Plantain argenté	<i>Plantago argentea</i> Chaix		
Platanthère verdâtre	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Reichenb.		
Potentille cendrée	<i>Potentilla cinerea</i> Chaix ex Vill.		
Potentille velue	<i>Potentilla hirta</i> L.		
Pulsatille de Haller	<i>Pulsatilla halleri</i> (All.) Willd.		
Pyrole verdâtre	<i>Pyrola chlorantha</i> Swartz		
Pyrole intermédiaire	<i>Pyrola media</i> Swartz		
Pyrole à feuilles rondes	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.		
Renoncule de Montpellier	<i>Ranunculus monspeliacus</i> L.		
Réséda des teinturiers	<i>Reseda luteola</i> L.		
Rose de France	<i>Rosa gallica</i> L.		
Rosier sempervirent	<i>Rosa sempervirens</i> L.		
Saxifrage silonnée	<i>Saxifraga exarata</i> subsp. <i>delphinensis</i> (Ravaud) Kerguelen		
Joubarbe des terrains calcaires	<i>Sempervivum calcareum</i> Jordan		
Séneçon bicolore	<i>Senecio cineraria</i> subsp. <i>bicolor</i> (Willd.) Arcangeli		
Séneçon doria	<i>Senecio doria</i> L.		
Serratule à tige nue	<i>Serratula nudicaulis</i> (L.) DC.		
Silène à petites fleurs	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel		
Stipe d'Offner	<i>Stipa offneri</i> Breistr.		
Torilis noueux	<i>Torilis nodosa</i>		
Trochiscanthe nodiflore	<i>Trochiscanthes nodiflora</i>		
	<i>Tulipa australis</i> Link		
Vaccaire d'Espagne	<i>Vaccaria hispanica</i> (Miller) Rauschert		
Véronique précoc	<i>Veronica praecox</i> All.		
Violette des rochers	<i>Viola rupestris</i> F.W. Schmidt		

Bibliographie

GARRAUD,L.

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique

2003 pages : 925 p Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin


TESSIER C.

Projet de réintroduction du vautour fauve dans le Diois

1992 pages : 27 p. Consultable : Parc Naturel Régional du Vercors



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF II* N°2618



* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Légende

- Périmètre de la ZNIEFF type 2
- Autres ZNIEFF type 2
- ZNIEFF type 1

