Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : **26180002**

Ancien N° régional : 26040001

Plateau de Saint Laurent

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 438,16 ha

Drôme CORNILLON-SUR-L'OULE, REMUZAT, SAINT-MAY

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens		Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	3	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	2

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **66**

Description et intérêt du site

Le plateau de Saint-Laurent se présente comme une vaste table calcaire, légèrement inclinée au sud-ouest, dominant les gorges de l'Aygues. L'accès le plus facile se fait par la route, en continuant après le village de Saint-May. Il est possible également de faire une belle randonnée en montant à pied depuis le pont sur l'Aygues. Par son exposition et sa situation géographique, le plateau est sous l'influence directe du climat méditerranéen, qui se manifeste autour du village de Saint-May par les oliveraies ; sa vocation est essentiellement agricole. Les cultures de lavandes et les vergers d'abricotiers, de tilleuls ou d'amandiers occupent le plateau après Bodon, où quelques fermes sont disséminées. En allant vers la croix du Caire et les rebords des rochers de Saint-Auban, il est couvert d'une garrigue plus ou moins dense dominée par le Genêt scorpion. Cette formation est entrecoupée de quelques parcelles de lavandes piquetées de petits boisements de Chêne blanc (ou Chêne pubescent). Ces milieux de landes et de garrigues sèches sont parcourus tout l'hiver par le troupeau de moutons d'un berger de la proche vallée. Sur le bord du chemin, un énorme chêne mort, vivant encore au début des années 1990, témoigne qu'une forêt imposante recouvrait le plateau il y a fort longtemps. L'avifaune remarquable du plateau fait depuis longtemps l'objet de suivis réguliers. Ces observations permettent de mettre en évidence la chute des effectifs de quelques espèces significatives. C'est la cas du Moineau soulcie (bien présent il y a moins de dix ans), du Traquet oreillard (dont le plateau marquait la limite nord de répartition), de la Pie-grièche méridionale et du Merle de roche. Le Traquet oreillard est une espèce des garrigues méditerranéennes. Quelques couples de ce traquet ont niché sur le plateau en 1982, 1983 et 1984. Depuis, il n'a plus été observé, si ce n'est une observation printanière près de Bodon en avril 1997. Cette observation est l'indice probable d'un déclin plus généralisé dont la raison principale semble être la fermeture des milieux. La Fauvette pitchou et la Fauvette mélanocéphale sont, par contre, toujours présentes dans les milieux buissonnants du plateau, tout comme le Bruant fou ou le Bruant ortolan. Cette dernière espèce, qui se raréfie à l'échelle européenne, atteint ici des densités assez élevées. Au crépuscule, les concerts du Hibou Petit-duc et de l'Engoulevent d'Europe accompagnent les soirées estivales. Au bout du plateau, la croix du Caire est un but de promenade apprécié et un remarquable point d'observation sur la vallée de l'Oule et les montagnes environnantes. Suite au retour du Vautour fauve dans les Baronnies, la fréquentation des promeneurs et des véhicules a fortement augmenté sur le plateau Saint-Laurent. Pour éviter de dénaturer le site, une aire de parking a été aménagée sur la piste conduisant à la croix du Caire, afin d'inciter les ornithologues amateurs à continuer à pied. Sur ce parking, un panneau apporte des informations sur la présence des Vautours fauves.

Milieux naturels

24.225	LITS DE GRAVIERS MEDITERRANEENS
32.132	MATORRAL ARBORESCENT A JUNIPERUS MACROCARPA
34.5	PELOUSES XEROPHILES MEDITERRANEENNES
44.14	GALERIES MEDITERRANEENNES DE GRANDS SAULES
45.3	FORETS DE CHENES VERTS MESO ET SUPRA MEDITERRANEENNES
54.12	SOURCES D'EAU DURE

Flore

Capillaire de Montpellier	*Adiantum capillus-veneris L.*
Egilope cylindrique	*Aegilops cylindrica Host*
Alysson champêtre	*Alyssum simplex Rudolphi in Schrader*
Doradille des sources	*Asplenium fontanum (L.) Bernh.*
Lunetière à feuilles de chicorée	*Biscutella cichoriifolia Loisel.*
Micropus dressé	*Bombycilaena erecta*
Calépine irrégulière	*Calepina irregularis (Asso) Thell.*
Centaurée de Trionfetti var.	*Centaurea triumfetti subsp. semidecurrens*
Cotonéaster du Dauphiné	*Cotoneaster delphinensis Chatenier*
Crupine commune	*Crupina vulgaris Cass.*
Dauphinelle fendue (Pied d'alouette fendu)	*Delphinium fissum Waldst. & Kit.*
Grand éphèdre	*Ephedra major Host [1831]*
Epipactis à petites feuilles	*Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz*
Euphorbe à têtes jaune d'or	*Euphorbia flavicoma subsp. flavicoma*
Fétuque de Breistoffer	*Festuca breistrofferi Chas, Kerguélen & Plonka*
Orchis odorant	*Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard*
Julienne laciniée	*Hesperis laciniata All.*
Ibéris penné	*Iberis pinnata L.*
Jasmin buissonnant	*Jasminum fruticans L.*
Genévrier de Phénicie	*Juniperus phoenicea L.*
Genévrier thurifère	*Juniperus thurifera L.*
Mélique pyramidale	*Melica minuta L.*
Mélilot de Naples	*Melilotus neapolitanus Ten.*
Nigelle de Damas	*Nigella damascena L.*
Picride à fleurs peu nombreuses	*Picris pauciflora Willd.*
Potentille cendrée	*Potentilla cinerea Chaix ex Vill.*
Rose de France	*Rosa gallica L.*
Joubarbe des terrains calcaires	*Sempervivum calcareum Jordan*
Séneçon bicolore	*Senecio cineraria subsp. bicolor (Willd.) Arcangeli*
Silène à petites fleurs	*Silene otites (L.) Wibel*
Stipe d'Offner	*Stipa offneri Breistr.*
Torilis noueux	*Torilis nodosa*
Vaccaire d'Espagne	*Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert*

Faune vertébrée

Mammifères

Molosse de Cestoni	*Tadarida teniotis*

Oiseaux

Pipit rousseline	*Anthus campestris*
Engoulevent d'Europe	*Caprimulgus europaeus*
Hirondelle de fenêtre	*Delichon urbica*
Bruant fou	*Emberiza cia*
Bruant ortolan	*Emberiza hortulana*
Faucon hobereau	*Falco subbuteo*
Vautour fauve	*Gyps fulvus*
Pie-grièche écorcheur	*Lanius collurio*
Alouette lulu	*Lullula arborea*
Bruant proyer	*Miliaria calandra*
Merle de roche	*Monticola saxatilis*
Merle bleu	*Monticola solitarius*
Traquet motteux	*Oenanthe oenanthe*
Hibou Petit-duc	*Otus scops*
Moineau soulcie	*Petronia petronia*
Fauvette orphée	*Sylvia hortensis*
Fauvette pitchou	*Sylvia undata*
Huppe fasciée	*Upupa epops*

Faune invertébrée

Papillons

Apollon	*Parnassius apollo*

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74

Bibliographie

BARBARO L., BOYER P.

Observations sur la nidification et l'évolution récente du Moineau soulcie (Petronia petronia L.) dans les Préalpes du sud (Drôme, Isère et Alpes de Haute-provence)

p 2 pages 1999 Consultable : CORA Région

BRAUD Y., SCHLEICHER J.

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

13 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

CHOISY J.-P., TESSIER C., HENRIQUET S.

Réintroduction du vautour fauve Gyps Fulvus : état actuel de la méthode en France

7 p. pages 2002 Consultable : Parc Naturel Régional du Vercors

CHOISY J-P.

Vautours : le retour

p 1 pages 2004 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CORA Drôme

Oiseaux de la Drôme

312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GARRAUD L.

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

TESSIER C.

Réintroduction du Vautour fauve dans les Baronnies - Suivi des oiseaux 1997-1999

26 pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

TYSSANDIER P.

La Fauvette orphée (Sylvia hortensis) en France

p 1 pages 1991 Consultable : CORA Région

VINCENT S.

Le retour du Vautour fauve dans les Baronnies, première étape de la réintroduction de l'espèce dans les Alpes

13 pages 1997 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°26180002



Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

N

Echelle : 1 / 25 000

fonds IGN Scan 25 (C)