



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 26180004

Ancien N° régional : 26040001

Roubine des lavandes et l'Oule à Rémuzat

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 12,87 ha

Drôme REMUZAT

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	0
Végétaux sucoérieurs	2	Oiseaux	0	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 2

Description et intérêt du site

Le village de Rémuzat a été construit dans le lit majeur de l'Oule, puis s'est protégé des crues de la rivière par une digue en pierre. Un peu au nord du village, une petite zone humide, marécageuse, laisse échapper une "roubine". L'eau alimente un ancien lavoir, traverse le village et rejoint l'Oule. Dans la zone humide, pousse une plante aux fleurs pourpres groupées en tête dense, la Sanguisorbe officinale, ou Grande Pimprenelle. Un petit papillon a comme particularité d'être très strictement inféodé à cette espèce végétale. L'Azuré de la sanguisorbe peut se délecter de son nectar mais surtout, une grande partie de son cycle de vie est en relation avec cette rosacée. La femelle pond ses œufs, de préférence, dans les inflorescences latérales de la pimprenelle en boutons. Les chenilles s'y développent en mangeant l'intérieur des fleurs. Après un certain temps de croissance, elle tombe à terre où elle est récupérée par une fourmi spécifique. Installée dans la fourmilière, la chenille finit son développement en se nourrissant des œufs et des larves des fourmis hôtes. En contre partie, la chenille sécrète du miellat. Les fourmis sont très friandes de ce liquide sucré. Tout cela pour qu'un beau jour, enfin, un beau papillon d'un bleu clair brillant prenne son envol. L'Azuré de la sanguisorbe est donc fortement dépendant de son environnement, c'est pour ça qu'il est si rare. Autre espèce remarquable, le petit crapaud Sonneur à ventre jaune a été observé il y a quelques années, mais depuis la construction de la petite station de pompage, la population semble avoir disparu.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Mammifères

Campagnol amphibie

Arvicola sapidus

Flore

Pas de données disponibles

Faune invertébrée

Papillons

Azuré de la sangisorbe

Maculinea teleius

Bibliographie

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 -

15 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GARRAUD L.

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Nature et humanisme

Sauvons le campagnol amphibie

22 pages 2004 Consultable : AVENIR

ROZIER Y.

Suivi Maculinea - Marais des Bidonnes - été 1997

13 pages 1997 Consultable : DIREN Rhône-Alpes




Liberté - Égalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°26180004



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)