



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 26180006

Ancien N° régional : 26045906,26045907

## Saint Roman, Piégros, et gorges de Pommerol

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 615,11 ha

Drôme

CORNILLAC, LA CHARCE, POMMEROL, ROTTIER

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	0
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 49

### Description et intérêt du site

Dans la vallée de l'Oule au nord des Baronnies, une petite route part du village de La Charce vers Rosans, dans les Hautes-Alpes. A deux kilomètres du village, la route traverse de belles gorges creusées par le ruisseau de Pommerol, naissant sous le col de la Fromagère. Ces gorges, découpées entre la montagne de Saint-Romans (1311 m d'altitude) et Piégros (1250 m) se distinguent par leur relief ruiniforme particulier : grandes falaises avec balcons et arche de pierre, éboulis pentus et instables au pied des parois jusqu'au ruisseau. Les buissons de diverses espèces de saules (Saule pourpre surtout) bordent le lit caillouteux du ruisseau. La végétation des rochers en versant sud est dominée par les genévriers : Genévrier de Phénicie, au port en boule, et Genévrier thurifère montrent ici une intéressante zone de contact. Les peuplements de Genévrier thurifère, dont certains arbres ont une belle taille, forment dans les gorges de Pommerol les plus belles thuriferaies de la région Rhône-Alpes. Ce genévrier pousse à l'état spontané dans l'Atlas marocain (en compagnie du Cèdre de l'Atlas) ainsi que dans les Sierras espagnoles. Il est présent également dans les Alpes et Préalpes du sud de la France (Drôme, Hautes-Alpes, et plus rarement Isère). Dans la Drôme, il se rencontre le plus souvent entre 500 et 1000 m d'altitude, en exposition plein sud, au pied des falaises. Cet arbre est protégé en région Rhône-Alpes. Un autre arbuste remarquable a été découvert très récemment dans les gorges : le Cotonéaster du Dauphiné. C'est une espèce des montagnes ouest-méditerranéennes dont la répartition demeure mal connue. Elle a été identifiée pour la première fois au tout début du vingtième siècle dans les Baronnies drômoises ; elle a depuis été observée en d'autres stations de la Drôme et des Hautes-Alpes. Les gorges et leurs éboulis sont des secteurs de prédilection pour la plus belle population de Chamois de la région. Les falaises hébergent également des espèces rares et discrètes, comme de grands rapaces ou comme le Tichodrome échelette. Ce petit oiseau gris souris aux ailes colorées papillonne le long des parois à la recherche d'insectes cachés dans les anfractuosités. Les landes chaudes du bas du vallon sont le domaine de la Pie-grièche écorcheur et du Bruant fou.

## Milieus naturels

32.136	MATTORAL ARBORECENT A JUNIPERUS THURIFEA
54.12	SOURCES D'EAU DURE

## Flore

Nielle des blés	<i>Agrostemma githago L.</i>
Ail rocambole (Rocambole)	<i>Allium scorodoprasum subsp. scorodoprasum</i>
Androsace de Chaix	<i>Androsace chaixii Gren. &amp; Godron</i>
Doradille des sources	<i>Asplenium fontanum (L.) Bernh.</i>
Centaurée de Trionfetti var.	<i>Centaurea triumfetti subsp. semidecurrans</i>
Linaire velue	<i>Chaenorrhinum villosum (L.) Lange</i>
Cirse de Montpellier	<i>Cirsium monspessulanum</i>
Cotonéaster du Dauphiné	<i>Cotoneaster delphinensis Chatenier</i>
Cotonéaster intermédiaire	<i>Cotoneaster x-intermedius (Lecoq &amp; Lamotte) Coste</i>
Crocus bigarré (Crocus de Crest)	<i>Crocus versicolor Ker-Gawler</i>
Œillet rude	<i>Dianthus scaber Chaix</i>
Grand éphédre	<i>Ephedra major Host [1831]</i>
Fraisier vert	<i>Fragaria viridis Weston</i>
Ibéris penné	<i>Iberis pinnata L.</i>
Genévrier de Phénicie	<i>Juniperus phoenicea L.</i>
Genévrier thurifère	<i>Juniperus thurifera L.</i>
Pivoine velue	<i>Paeonia officinalis subsp. huthii Soldano [1993]</i>
Raiponce de charmeil	<i>Phyteuma charmelii Vill.</i>
Pyrole verdâtre	<i>Pyrola chlorantha Swartz</i>
Pyrole intermédiaire	<i>Pyrola media Swartz</i>
Pyrole à feuilles rondes	<i>Pyrola rotundifolia L.</i>
Réséda des teinturiers	<i>Reseda luteola L.</i>
Joubarbe des terrains calcaires	<i>Sempervivum calcareum Jordan</i>
Silène à petites fleurs	<i>Silene otites (L.) Wibel</i>
Véronique précoce	<i>Veronica praecox All.</i>

## Faune vertébrée

### Mammifères

Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>
---------	----------------------------

### Oiseaux

Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>
Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Gélinotte des bois	<i>Bonasa bonasia</i>
Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
Hirondelle de rochers	<i>Hirundo rupestris</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Venturon montagnard	<i>Serinus citrinella</i>
Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i>
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>

## Faune invertébrée


Pas de données disponibles

## Bibliographie

GARRAUD L.

*Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique*

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin



### Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy