



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 26190004

Ancien N° régional : 26655901

Forêt du Tay

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 555,11 ha

Drôme BARRET-DE-LIOURE, SEDERON

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	2	Reptiles	2	Coléoptères	0
		Mammifères	3			Libellules	0
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 17

Description et intérêt du site

Au sud de Séderon, la Méouge entaille à sa source le rebord du plateau d'Albion, en creusant la combe de Tay. Les pentes abruptes de cette combe sont couvertes d'une hêtraie assez fraîche. Cette forêt se modifie, en atteignant des stations plus sèches, vers le sommet ou sur les versants nord-est et sud-est de la combe. La diversité de cette forêt, mesurée en nombre d'espèces présentes, provient de divers facteurs : un étagement assez important (de moins de 900 m à plus de 1400 m d'altitude), des conditions d'humidité très différentes entre la combe fraîche et le plateau plus sec, et probablement une exploitation peu poussée. Dans le sous-bois, les orchidées sont relativement fréquentes. On peut plus particulièrement mentionner les céphalanthères, l'Epipactis de Mueller, et la Racine de corail. Cette dernière, presque entièrement de couleur brune, est non chlorophyllienne. Cette orchidée saprophyte se nourrit, en effet, à partir de la matière organique en décomposition. Très discrète, elle fleurit en été dans les sous-bois de la hêtraie. Le site favorise également un ensemble d'oiseaux forestiers, comme l'Autour des palombes, la Gêlinotte des bois ou le Grimpereau des bois.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Flore

Sabot de Vénus	<i>Cypripedium calceolus L.</i>
Fusain à larges feuilles	<i>Euonymus latifolius (L.) Miller</i>
Millepertuis à feuilles d'Hysope	<i>Hypericum hyssopifolium Chaix</i>
Gesse blanchâtre	<i>Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides (Gouan) Bässler</i>
Pivoine officinale	<i>Paeonia officinalis L.</i>
Plantain argenté	<i>Plantago argentea Chaix</i>
Renoncule de Montpellier	<i>Ranunculus montpeliacus L.</i>

Bibliographie

GARRAUD L.

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

Faune vertébrée

Mammifères

Chamois *Rupicapra rupicapra*

Oiseaux

Autour des palombes *Accipiter gentilis*
Gélinotte des bois *Bonasa bonasia*
Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*
Grimpereau des bois *Certhia familiaris*
Hirondelle rousseline *Hirundo daurica*
Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra*
Tétras lyre *Tetrao tetrix*

Faune invertébrée

Pas de données disponibles




Liberté • Égalité • Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°26190004



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Ancecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)