



Montagne de Chamouse

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 2 269,93 ha

Drôme BALLONS, CHAUVAC, EYGALAYES, IZON-LA-BRUISSE, LABOREL, MONTAUBAN-SUR-L'OUVEZE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux sucoérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 105

Description et intérêt du site

La montagne de Chamouse est l'une des plus grandes des Baronnies ; elle culmine à 1531 m d'altitude, à quelques kilomètres au nord-ouest de la montagne de Lure. Sa belle silhouette se dégage nettement au-dessus du Séderonnais, et des petits villages d'Izon-la-Bruisse et de Laborel. Elle est le point culminant d'un grand bassin synclinal orienté est-ouest, et dans lequel l'Ouvèze s'écoule. La route de la vallée de l'Ouvèze serpente sur ses flancs, et franchit la ligne de crête au col de Perty, à 1300 m d'altitude. Sous le col de Perty, un ensemble de petites sources a permis la seule observation drômoise d'une grosse libellule, inscrite sur la liste rouge nationale des espèces menacées, le Cordulégastré bidenté. A l'est du sommet, le village d'Izon-la-Bruisse s'est établi dans un environnement montagneux, entre les montagnes de Garre à l'est, d'Herc au nord et de Chamouse à l'ouest. Sur la montagne de Chamouse, un grand pâturage couvre toutes les pentes douces du nord-ouest jusqu'au sommet. Les moutons l'atteignent depuis la grande bergerie au-dessus du hameau de Somecure. La Fritillaire du Dauphiné pousse sur des pelouses sèches et rocailleuses en populations relativement importantes. On la trouve en compagnie de la Lavande vraie et du Thym vulgaire, mais aussi, sur certains secteurs, de gagées. Très caractéristique par ses fleurs inclinées vers le bas, la fritillaire semble sortie tout droit d'un jardin, et pourrait être menacée par les cueillettes. Plusieurs espèces de papillons, dont l'Apollon et le Semi-apollo, survolent les milieux herbeux et les pâturages en fleurs. Présents sur quelques montagnes méditerranéennes, le Genêt de Villars est un petit arbuste rampant, qui forme sur les crêtes rocheuses des coussinets épineux, ornés au printemps de fleurs jaunes. Le Merle de roche, caractéristique des pelouses rocheuses, est un oiseau très coloré mais discret, surveillant du haut des rochers les alentours. Quelques chamois fréquentent les crêtes de ces montagnes, mais les observations ne portent généralement que sur quelques individus, indice d'une colonisation laborieuse. La nidification du Bec-croisé des sapins a été constatée sur des Pins sylvestres sous le sommet. Cet oiseau, au plumage rouge ou verdâtre selon le sexe, se nourrit exclusivement de graines de résineux, qu'il extrait du cône grâce à son bec particulier. L'Aigle royal est régulièrement observé en chasse sur Chamouse, et niche à proximité dans un site rocheux. D'après des renseignements locaux, le Tétralyx pourrait être présent, mais cette information n'a pas été confirmée. Les landes chaudes et les garrigues plus ou moins denses et boisées, couvrent de vastes étendues sur les pentes des montagnes. Elles sont habitées par un ensemble d'espèces méridionales, montrant parfois des densités assez importantes : des bruants (Bruant fou et Bruant ortolan), des fauvettes (Fauvettes passerinette, pitchou, et orphée), l'Engoulevent d'Europe, et deux espèces de pies-grièches... Le versant nord-est de la montagne de Chamouse, nettement plus frais, est couvert d'un boisement remarquable de Hêtres, accompagnés d'ifs et de nombreux arbustes (Noisetier, Fusain à feuilles larges, Cytise des Alpes...). Cette belle hêtraie à ifs est un type de boisement rare dans les Baronnies, et abrite des espèces rares et assez localisées dans ces montagnes provençales.

Milieus naturels

34.33	PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES
34.5	PELOUSES XEROPHILES MEDITERRANEENNES
41.13	HETRAIES NEUTROPHILES
41.16	HETRAIES SUR CALCAIRE
41.175	HETRAIES CALCICOLES SUB MEDITERRANEENNES

Flore

Aconit tue-loup	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>vulparia</i> (Reichenb. ex Sprengel) Nyman
Ail jaune	<i>Allium flavum</i> L.
Androsace de Chaix	<i>Androsace chaixii</i> Gren. & Godron
Anthémis de Trionfetti	<i>Anthemis triumfetti</i>
Arabette nouvelle	<i>Arabis nova</i> Vill.
Doradille des sources	<i>Asplenium fontanum</i> (L.) Bernh.
Centauree de Trionfetti var.	<i>Centaurea triumfetti</i> subsp. <i>semidecurrens</i>
Centauree de Trionfetti var.	<i>Centaurea triumfetti</i> subsp. <i>triumfetti</i>
Cytise à longs rameaux	<i>Chamaecytisus elongatus</i> (Waldst. & Kit.) Link
Crocus bigarré (Crocus de Crest)	<i>Crocus versicolor</i> Ker-Gawler
Crupine commune	<i>Crupina vulgaris</i> Cass.
Sabot de Vénus	<i>Cypripedium calceolus</i> L.
Cytise de Sauze	<i>Cytisus sauzeanus</i> Burnat & Briq.
Éillet rude	<i>Dianthus scaber</i> Chaix
Epipactis à petites feuilles	<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Swartz
Fusain à larges feuilles	<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Miller
Euphorbe à têtes jaune d'or	<i>Euphorbia flavicoma</i> subsp. <i>flavicoma</i>
Fraisier vert	<i>Fragaria viridis</i> Weston
Fritillaire du Dauphiné	<i>Fritillaria tubiformis</i> Gren. & Godron
Gagée jaune	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker-Gawler
Gagée des prés	<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort.
Gagée des champs	<i>Gagea villosa</i> (M. Bieb.) Sweet
Gailllet grêle	<i>Galium spurium</i> subsp. <i>tenerum</i> (Schleich. ex Gaudin) Kerguelen
Genêt de Villars	<i>Genista pulchella</i> subsp. <i>villarsii</i> (G.C. Clementi) Kerguelen
Avoine toujours verte	<i>Helictotrichon sempervirens</i> (Vill.) Pilger
Julienne laciniée	<i>Hesperis laciniata</i> All.
Epervière tomenteuse	<i>Hieracium tomentosum</i> L. [1755]
Millepertuis à feuilles d'Hysope	<i>Hypericum hyssopifolium</i> Chaix
Ibéris des rochers	<i>Iberis saxatilis</i> L.
Bugrane striée	<i>Ononis striata</i> Gouan
Plantain argenté	<i>Plantago argentea</i> Chaix
Potentille cendrée	<i>Potentilla cinerea</i> Chaix ex Vill.
Potentille velue	<i>Potentilla hirta</i> L.
Pulsatille de Haller	<i>Pulsatilla halleri</i> (All.) Willd.
Pyrole à feuilles rondes	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.
Renoncule de Montpellier	<i>Ranunculus monspeliacus</i> L.
Joubarbe des terrains calcaires	<i>Sempervivum calcareum</i> Jordan
Séneçon doria	<i>Senecio doria</i> L.
Silène des forêts	<i>Silene nemoralis</i> Waldst. & Kit.
Silène à petites fleurs	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel
Silène paradoxale	<i>Silene paradoxa</i> L.
Grande Tordyle	<i>Tordylium maximum</i> L.
Tulipe méridionale	<i>Tulipa australis</i> Link
Valérianelle dentée	<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich
Véronique précoce	<i>Veronica praecox</i> All.
Violette admirable	<i>Viola mirabilis</i> L.
Violette des rochers	<i>Viola rupestris</i> F.W. Schmidt

Faune vertébrée

Mammifères	
Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>
Oiseaux	
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Pie-grièche méridionale	<i>Lanius meridionalis</i>
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Merle de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>
Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i>

Faune invertébrée

Coléoptères	
Barbot ou Pique-prune	<i>Osmoderma eremita</i>
Libellules	
Cordulégastre bidenté	<i>Cordulegaster bidentata</i>
Papillons	
Apollon	<i>Parnassius apollo</i>

Bibliographie

BRAUD Y., SCHLEICHER J.

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

13 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

BRUNEAU G.

*Première mention et hivernage de la Pie-grièche méridionale (*Lanius elegans meridionalis*) en Isère*

p 2 pages 1998 Consultable : CORA Isère

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CORA Drôme

Oiseaux de la Drôme

312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

COULON, T.

Cartographie de la végétation de la montagne de Chamouse (Drôme)

pages 2000 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

GARRAUD L.

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

GRAND D.

Les libellules du Rhône

255 pages 2004 Consultable : Société Linnéenne de Lyon

ISENMANN P., BOUCHET J.C.

*L'aire de distribution française et le statut taxinomique de la Pie-grièche grise méridionale (*Lanius elegans meridionalis*)*

p 2 pages 1993 Consultable : CORA Région

LAFRANCHIS T.


Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

TYSSANDIER P.

*La Fauvette orphée (*Sylvia hortensis*) en France*


p 1 pages 1991 Consultable : CORA Région



Légende




Périmètre de la ZNIEFF type 1



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy