



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 26190014

Ancien N° régional : 26625904

Plateau des Moures et de Saint Auban-sur-Ouvèze

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1 145,71 ha

Drôme

SAINT-AUBAN-SUR-L'OUVEZE, SAINTE-EUPHEMIE-SUR-OUVEZE, SAINT-SAUVEUR-GOUVERNET

Niveau de connaissance

Milieus naturels	0	Amphibiens	0	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 49

Description et intérêt du site

Entre les villages de Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze et de Saint-Auban-sur-Ouvèze, le plateau des Moures est traversé par le CD 64 qui monte au col de Peyreruergue. Au sud, le plateau se termine sur de petites barres rocheuses dominant d'une trentaine de mètres le lit de l'Ouvèze. La pente exposée plein sud, régulière entre les barres rocheuses et la route, devient au nord de celle-ci plus accentuée. La végétation du plateau se compose principalement d'une garrigue épineuse dominée par le Genêt scorpion, le Buis ou les genévriers. Y subsistent également des boisements épars de Chêne pubescent et des cultures (vigne et lavande surtout). Quelques fermes sont implantées sur le plateau. Les cultures extensives, blé ou lavande, permettent le maintien d'une flore particulière, avec des espèces de grand intérêt parmi lesquelles la Gagée des champs, la Nielle des blés ou la Tulipe sauvage. Dans le département, cette dernière espèce est présente dans la vallée de la Drôme, et plus localement dans les Baronnies. Signalée depuis plus de cent ans par les botanistes dans la région de Saint-Auban-sur-Ouvèze, la Tulipe sauvage a vu ses stations régresser fortement suite à des bouleversements de son habitat (constructions, modifications culturelles...) ou en raison de cueillettes abusives en plein champ. L'avifaune du plateau est très représentative des milieux de landes et pelouses méditerranéennes. Le Traquet oreillard et le Moineau soulcie, tous deux disparus de plusieurs localités des Baronnies, nichent encore en petit nombre sur ce plateau. Les landes plus ou moins denses et hautes sont l'habitat de la Fauvette pitchou, le Pipit rousseline, le Bruant fou et le Bruant ortolan. Les pies-grièches se perchent volontiers sur les arbustes pour chasser à l'affût. Environ trois couples de Pies-grièches méridionales sont ainsi connus sur le plateau. On les trouve en compagnie de la Pie-grièche écorcheur, un peu plus fréquente. Dans les boisements et les milieux boisés ouverts, on peut également entendre la Fauvette orphée, au chant caractéristique, l'Alouette lulu, et l'Engoulevent d'Europe qui se manifeste au crépuscule.

Milieus naturels

41.16	HETRAIES SUR CALCAIRE
41.175	HETRAIES CALCICOLES SUB MEDITERRANEENNES
82.3	CULTURES EXTENSIVES

Flore

Nielle des blés	<i>Agrostemma githago L.</i>
Ail jaune	<i>Allium flavum L.</i>
Doradille des sources	<i>Asplenium fontanum (L.) Bernh.</i>
Centauree de Trionfetti var.	<i>Centaurea triumfetti subsp. semidecurrans</i>
Centranthe de Lecoq	<i>Centranthus lecoqii Jordan</i>
Cirse de Montpellier	<i>Cirsium monspessulanum</i>
Echinops à têtes rondes	<i>Echinops sphaerocephalus L.</i>
Gagée des champs	<i>Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet</i>
Orchis odorant	<i>Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard</i>
Millepertuis à feuilles d'Hysope	<i>Hypericum hyssopifolium Chaix</i>
Genévrier de Phénicie	<i>Juniperus phoenicea L.</i>
Espartacette des rochers	<i>Onobrychis saxatilis (L.) Lam.</i>
Joubarbe des terrains calcaires	<i>Sempervivum calcareum Jordan</i>
Stipe d'Offner	<i>Stipa offneri Breistr.</i>
Grande Tordyle	<i>Tordylium maximum L.</i>
Tulipe sauvage	<i>Tulipa sylvestris subsp. sylvestris</i>
Véronique précoce	<i>Veronica praecox All.</i>

Faune vertébrée

Oiseaux

Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Pie-grièche méridionale	<i>Lanius meridionalis</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Bruant proyer	<i>Miliaria calandra</i>
Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i>
Hibou Petit-duc	<i>Otus scops</i>
Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>
Venturon montagnard	<i>Serinus citrinella</i>
Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>
Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i>
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>

Reptiles

Lézard ocellé	<i>Lacerta lepida</i>
---------------	-----------------------

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

BARBARO L., BOYER P.

Observations sur la nidification et l'évolution récente du Moineau soulcie (Petronia petronia L.) dans les Préalpes du sud (Drôme, Isère et Alpes de Haute-provence)
p 2 pages 1999 Consultable : CORA Région

BROYER J.

Evaluation de l'incidence des mesures agri-environnementales sur l'avifaune prairiale dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002)
15 pages 2002 Consultable : ONCFS

BRUNEAU G.

Première mention et hivernage de la Pie-grièche méridionale (Lanius elegans meridionalis) en Isère
p 2 pages 1998 Consultable : CORA Isère

CHEYLAN M., GRILLET P.

Le lézard ocellé en France
p 2 pages 2003 Consultable : Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes
335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CORA Drôme

Oiseaux de la Drôme

312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GARRAUD L.

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

ISENMANN P., BOUCHET J.C.


*L'aire de distribution française et le statut taxinomique de la Pie-grièche grise méridionale (*Lanius elegans meridionalis*)*

p 2 pages 1993 Consultable : CORA Région

TYSSANDIER P.

*La Fauvette orphée (*Sylvia hortensis*) en France*

p 1 pages 1991 Consultable : CORA Région



Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy